

III. — EENIGE AANTEKENINGEN OMTRENT NEDERLANDSCHE JASSIDAE UIT DE VERZAMELING A. J. F. FOKKER.

DOOR H. C. BLÖTE.

Daar ik bij de revisie onzer Jassidae in 1927 niet in de gelegenheid was het materiaal uit de verzameling A. J. F. FOKKER na te zien en het mij nu blijkt dat het materiaal dezer verzameling aanleiding geeft tot enkele rectificaties, volgen hier deze aantekeningen.

Cicadula sexnotata (Fall.).

In de verzameling bevinden zich door LETHIERRY als *C. diminuta* Leth. gedetermineerde exemplaren, die behooren tot *Cicadula sexnotata* (Fall.) var. *salina* Reut., welke var. dus inlandsch is, de var. *devastans* Guér. echter eveneens. Indien *Cicadula sexnotata* (Fall.) var. *salina* Reut. inderdaad hetzelfde is als *Cicadula diminuta* Leth., wat m. i. lang niet zeker is, zou de naam *salina* Reut. moeten vervallen.

Thamnotettix erythrostictus (Leth.).

De door FOKKER vermelde exemplaren waren door LETHIERRY gedetermineerd, doch behooren tot *Thamnotettix dilutior* Kb.

Euscelis aemulans (Kb.).

Het exemplaar van Zierikzee, door FOKKER als *Athysanus aemulans* Kb. vermeld, is *Euscelis sahlbergi* (Reut.).

Euscelis onustus Ferr.

Was juist gedetermineerd.

Euscelis variegatus (Kb.).

Slechts één exemplaar (VAN MEDENBACH DE ROOY, Oosterbeek, September) is juist gedetermineerd, de overige exemplaren behooren grotendeels tot *Euscelis lineolatus* Brullé, enkele tot *Euscelis plebejus* (Fall.).

Paralimnus formosus (Boh.).

De als *Deltocephalus formosus* Boh. in den Catalogus van FOKKER vermelde exemplaren behooren tot *Deltocephalus ocellaris* (Fall.). De soort is dus nog niet uit Nederland bekend.

Deltocephalus distinguendus Flor.

De als zoodanig door FOKKER vermelde exemplaren behooren tot *Deltocephalus falléni* Fieb. De soort is echter wel inlandsch.

Deltocephalus striatus (L.).

De door FOKKER als *Deltocephalus sabulicola* Curt. vermelde exemplaren behooren tot deze soort.

Platymetopius undatus (De G.).

Is juist gedetermineerd.

Aphrodes tricinctus Curt.

Het als *Acocephalus tricinctus* Curt. gedetermineerde exemplaar behoort tot *Aphrodes trifasciatus* (Geoffr.).

Aphrodes albifrons (L.).

In de verzameling bevindt zich het type van *Jassus apicalis* v. Voll. dat overeenkomt met *Aphrodes albifrons* (L.) var. *apicalis* Sign. Daar de naam van SNELLEN VAN VOLLENHOVEN ouder is, moet de var. dus *apicalis* v. Voll. heeten.

Dicraneura flavipennis (Zett.).

De als zoodanig in de verzameling aanwezige exemplaren behooren grootendeels tot *Dicraneura critinella* (Zett.); het exemplaar van Zierikzee is een immatuur ♀, waarschijnlijk van *Dicraneura agnata* (Leth.). De soort is echter wel uit Nederland bekend.

Chlorita solani (Curt.).

Alle exemplaren in de verzameling als *Chlorita solani* Koll. gedetermineerd, behooren tot *Chlorita flavescens* (F.). De soort is dus niet inlandsch.

Eupteryx vittata (L.).

De exemplaren, door FOKKER vermeld van „Zundert 7 en Wassenaar 10, S. v. V.”, behooren tot *Eupteryx notata* Curt.

Eupteryx abrotani Dougl.

Is juist gedetermineerd.

Typhlocyba cruenta H.-S. var. *lethierryi* Edw.

De door FOKKER als *Typhlocyba lethierryi* Edw. vermelde exemplaren

behooren alle tot *Typhlocyba rosae* (L.). De var. *lethierryi* Edw. is dus nog niet uit Nederland bekend.

Typhlocyba douglasi Edw.

Het door FOKKER vermelde exemplaar is een ♀, doch waarschijnlijk wel juist gedetermineerd.

Idiocerus herrichi Kb.

De als zoodanig door FOKKER vermelde exemplaren behooren tot *Idiocerus lituratus* (Fall.). De soort is echter wel inlandsch.

Idiocerus cognatus Fieb.

Alle als zoodanig in de collectie FOKKER aanwezige exemplaren behooren tot *Idiocerus vitreus* (F.). De soort is dus niet inlandsch.

Idiocerus populi (L.).

Tot deze soort behooren tevens de als *Idiocerus infumatus* Fieb. vermelde exemplaren.

Macropsis virescens (F.).

In de verzameling bevinden zich inlandsche exemplaren van de var. *latestriata* Strobl.

Naar aanleiding van het bovenstaande is het aantal inlandsche soorten der familie Jassidae met vier te verminderen, en wordt dus 157.
