

BUPRESTIDES DU MUSÉE DE LEIDEN

(2ème note)

par

A. THERY

attaché au Muséum National d'Histoire Naturelle.

Cyphogastra Kampeni nov. spec.

♀ ; Long. : 29 mm ; larg. : 9 mm. — Allongé, très atténué postérieurement, ayant sa plus grande largeur vers le tiers postérieur des élytres ; entièrement d'un beau vert émeraude à aspect de laque, en dessus, d'un vert légèrement bleuâtre et très brillant, en dessous. Le dessus avec des impressions sur le pronotum et sur les élytres, remplies d'une sécrétion pulvérulente très dense cachant le fond.

Tête petite, grossièrement et éparsément ponctuée, irrégulièrement impressionnée en avant, sillonnée dans sa longueur, le sillon profond en avant et arrêté par un bourrelet transversal situé au dessus de l'épistome. Epistome échancré en arc et surmonté d'une impression en forme de croissant, cilié de poils roux, abondants ; labre invisible. Yeux assez saillants, larges, régulièrement elliptiques. Antennes noires, dépassant le niveau du bord antérieur des hanches antérieures, le 2ème article très court, globulaire, pas plus long que large, le 3ème article le plus long de tous, les suivants allant en diminuant progressivement jusqu'au sommet.

Pronotum un peu plus d'une fois et un tiers aussi large que long (8.25×6), à peine plus long que large au sommet (6×5.25), ayant sa plus grande largeur à la base, insensiblement rétréci en courbe, de la base au sommet, très faiblement sinué avant les angles postérieurs, ceux-ci un peu saillants. Bord antérieur faiblement bisinué, le lobe médian imperceptiblement échancré au milieu, cilié de chaque côté, la base faiblement et largement bisinuée, avec le lobe médian arrondi. Disque très profondément sillonné dans sa longueur, le sillon linéaire au fond ; les parties situées entre le sillon et les impressions latérales, presque lisses et assez bombées, les côtés avec deux impressions placées l'une au dessus de l'autre, les inférieures

plus grandes et plus irrégulières; dans leur ensemble elles rappellent un peu le sillon oblique de *C. Bruyni* Lansb.; les côtés sont très grossièrement ponctués. Non loin des angles antérieurs, un petit sillon arqué, non pulvérulent s'avance vers le centre du disque.

Ecusson très petit, en trapèze, plus long que large.

Elytres un peu plus larges à la base que la base du pronotum, élargis aux épaules où ils forment une sorte de lobe saillant arrondi, légèrement sinués derrière l'épaule, faiblement élargis ensuite jusqu'au tiers postérieur, où




Fig. 1. *Cyphogastra*
Kampeni.

ils ont leur plus grande largeur, puis rétrécis en une courbe concave, jusqu'au sommet où ils sont déhiscent à la suture et assez fortement denticulés, la denticulation ne remontant guère sur les côtés. La carène épipleurale est mal définie et se confond avec l'épipleure. Disque entièrement recouvert d'une très grosse ponctuation enfoncée, dont les intervalles sont saillants et anastomosés, formant une sorte de réticulation et de vagues rides transversales à la base, cette ponctuation est irrégulièrement disposée à l'exception d'une ligne qui longe la suture et d'une autre qui traverse le disque dans toute sa longueur, vers son milieu. Bord antérieur du prosternum sinueux, faiblement lobé de chaque côté, la saillie prosternale sillonnée profondément dans toute sa longueur, presque jusqu'au bord antérieur. Abdomen très finement ponctué, la ponctuation très éparse au milieu sur un fond lisse et très brillant, la plaque du 1er sternite très robuste, très bien délimitée postérieurement et surplombant fortement le 2ème sternite.

Côtés des sternites ornés, à égale distance du bord et de la ligne médiane, d'une impression très finement et très densément pointillée et pulvérulente. Une autre impression plus faible et arquée, se remarque près des bords. Pattes sans caractères spéciaux, tarsi noirs.

Habitat: Humboldt baie, dans le Nord de la Nouvelle Guinée Néerlandaise. Cette espèce a été récoltée par le Dr P. N. van Kampen, de la Mission hollandaise en Nouvelle Guinée (1911). Un seul exemplaire. Le type se trouve actuellement dans la collection du Musée de Leiden (Hollande).

Cette espèce se rattache nettement à *C. Bruyni* Lansb., elle a presque la même forme mais elle s'en distingue de suite par la présence de quatre taches sur les élytres et l'absence de tache humérale se prolongeant le long de la base.