

II. — DE IDENTITEIT VAN *RATTUS BUKIT* BONHOTE.

DOOR DR. O. L. E. DE RAADT.

In 1903 beschreef Bonhote 1) onder den naam van *Mus bukit* een rat, afkomstig van het Maleische schiereiland (Jalor); aangezien nu deze *R. bukit* ook op Java voorkomt en in de Indische literatuur eertijds onder den naam van *R. jerdoni* Blyth te boek stond, is het zeer zeker de moeite waard eens na te gaan, op welke wijze de naam *bukit* ontstaan is; men kan nu bij Hossack 2) het volgende hierover vinden, hij schrijft (blz. 4):

„Mr. Bonhote admits that a series of *M. bukit* agreed exactly with a series sent home by Mr. Lyle from Assam and recorded by Mr. Bonhote himself as *M. jerdoni*. Nevertheless, not only does he retain the name of *M. bukit*, but he places it in a different subgroup from *M. jerdoni*, namely, that of *M. griseiventer* ¹⁾. *M. peltax* is practically a prototype of *M. jerdoni*, but he separates them”.

Ziedaar nu de zeer zonderlinge en allesbehalve wetenschappelijke wijze, waarop door Bonhote deze zoogenaamde *Mus bukit* van de *Mus jerdoni* is afgescheiden; desniettemin heeft hij, zooals uit de literatuur blijkt, met deze afscheiding nog zoo'n bijval geoogst, dat sindsdien de *R. bukit* op Java zelfs in 2 subspecies is onderverdeeld ²⁾, terwijl tevens de naam *R. jerdoni* Blyth geheel uit de Indische literatuur is verdwenen!

Het is dan ook, meen ik, thans wel heel duidelijk, dat er hoegenaamd niet het minste verschil bestaat tusschen *R. bukit* en *R. jerdoni* en dat derhalve de tegenwoordig gangbare namen *R. bukit treubi* en *R. bukit temmincki* van stonde af aan plaats zullen moeten maken voor den vroeger bestaanden naam van de bewuste rat, n.l. *R. jerdoni* Blyth.

LITERATUUR.

1. Bonhote, Geciteerd naar Hossack.
2. Hossack, An account of the rats of Calcutta, 1907.

Oegstgeest, September 1932.

1) Abusievelijk is hier geschreven *M. griseiventer* in plaats van *M. niveiventer*, zooals uit blz. 47 van Hossack's werk blijkt (de R.).

2) Natuurlijk volgens het oude en beproefde recept van Brehm en Crespon, n.l. het zoo breed mogelijk uitmeten van onbeduidende kleurverschillen.
