

P I T T A

PAR

H. S C H L E G E L.

Janvier 1863.

I. Espèces à queue courte et très peu arrondie.

A. Taille forte, égalant environ celle du pluvier doré.

PITTA COERULEA, Vigors; Schlegel, Vogels van Nederl. Indië, 4°, Haarlem, chez Kruseman, Pitta, 1863, pl. 1, fig. 1, 2 et 3. — *Myiothera coerulea*, Raffles. — *Pitta gigas*, Temminck, Pl. col. 217. (1823) *Type Paris (Diard, Duvaucel)*

Dos, ailes et queue d'un bleu de cobalt dans les adultes, brun dans le plumage imparfait. — Aile 5 pouces 4 lignes; queue 2 pouces 2 lignes; tarse 22 lignes; bec 14 lignes.

Habite l'île de Sumatra. *Borneo*

1. Mâle adulte (Bencoelen) à Sumatra, (voyage de Diard et Duvaucel); individu fig. dans Schlegel; Vogels van Nederlandsch Indie, Pitta, pl. 1, fig. 1. — 2. Mâle, livrée parfaite, même origine que le N°. 1. — 3. Femelle, livrée de passage, même origine que les N°. 1 et 2: individu figuré dans Schlegel, l. c., pl. 1, fig. 2. — 4. Jeune mâle, en grande partie au premier

plumage, pris en Juin 1834, Batang-Singalang, côte Sud-Ouest de Sumatra, voyage de Mr. S. Müller: individu figuré dans Schlegel, l. c., pl. 1, fig. 3.

PITTA MAXIMA, Forsten; Schl., l. c., Pitta, pl. 1, fig. 4.

Tête, cou, scapulaires, dos et queue noirs. — Aile 5 pouces 2 lignes; queue 2 pouces 9 lignes; tarse 26 lignes.

Habite l'île de Halmahera. *h. Baljan (Vorderman) in Falck!*

1. Femelle adulte, Dodingo à Halmahera, ¹⁸⁴¹ voyage du Dr. Forsten: individu figuré dans Schlegel, l. c., Pitta, pl. 4. —
2. Mâle adulte, même origine que le N^o. 1. — 3 et 4. Mâles adultes, tués le 26 Avril 1862, Dodingo à Halmahera, voyage du Dr. Bernstein. — 5. Mâle adulte, tué le 7 Novembre 1861, même origine que les N^o. 3 et 4. — 6. Mâle avec le bleu du haut des ailes fortement mêlé de vert, tué le 10 Avril 1862, même origine que les N^o. 3, 4 et 5.

PITTA NIPALENSIS, Blyth; Gould, Birds of Asia, pl. 2. — Paludicola et Heleornis nipalensis, Hodgson. — Brachyurus nipalensis, Bonaparte, Conspetus, I, p. 253. — Pitta cyanea, auct., juv.?

Dessus d'un vert terne olivâtre; dessous brun-jaune; nuque d'un vert de mer foncé et terne.

Observée au Nipaul, Bootan et Darjeling.

1. Individu du Nipaul, par Mr. Frank.

B. Teinte dominante verte; tête et cou noirs ou plus ou moins bruns. Haut des ailes et le plus souvent aussi les couvertures supérieures de la queue d'un bleu blanchâtre métallique. Abdomen et plumes sous-caudales d'un rouge pouceau.

a. Pennes de la queue noires, bordées à leur l'extrémité de vert-bleu foncé.

2. 2. 2. Müller

PITTA PHILIPPENSIS, Vieillot. — Corvus philippensis, Gmel. (exc. syn. Brisson). — Pitta atricapilla, Cuvier. — Brachyurus atricapillus, Bonap., Consp., I, p. 256.

Taille très petite. Aile 3 pouces et 7 à 8 lignes. Tarse 16 lignes. Queue 14 lignes. Bec 10 lignes. Grandes rémiges blanches, noires à la base et à l'extrémité.

Habite les îles Philippines.

1. Mâle adulte, Philippines, par Mr. Frank. — 2. Adulte, Philippines, présenté par Mr. J. Verreaux, 1862.

PITTA ATRICAPILLA, Müller et Schlegel, Verh. Ned. Ov. Bez., Zool., Pittae, p. 19; Schlegel, l. c., Pitta, pl. 2, fig. 2 et 3. — Brachyurus Mülleri, Bonap., Consp., I, p. 256. — Merle verd à tête noire des Moluques, Merula viridis atricapilla moluccensis, Brisson, I, pl. 32, fig. 2.

Très voisine de la Pitta philippensis, mais à taille un peu plus forte, et à bec plus court. — Aile 4 pouces 3 lignes; queue 17 lignes; tarse 17 lignes.

Habite l'île de Bornéo.

F N° 123 Type atricapilla
 = P. Müller's Sp

1. Mâle adulte, figuré par Schlegel, Pitta, l. c., pl. 2, fig. 2; Bornéo méridional, voyage de Mr. S. Müller. — 2. Femelle adulte, tuée en Août 1836, Bornéo méridional, voyage de Mr. S. Müller. — 3. Femelle adulte, Bornéo méridional, voyage de Schwaner. — 4. Jeune femelle en partie au 1^{er} plumage, Bornéo méridional, voyage de Schwaner. — 5. Jeune femelle en grande partie au 1^{er} plumage, figuré par Schlegel, Pitta, l. c., pl. 2, fig. 3; Bornéo méridional, voyage de S. Müller.

6. Squelette, Bornéo méridional, voyage de Mr. S. Müller.

atrica, part
 PITTA BANGKANA, Schlegel, Vog. Ned. Indië, P., pl. 2, fig. ^{= cuc}

5. — Absolument comme l'atricapilla, mais d'une taille tant soit peu moins forte et aux plumes du sommet de la tête et plus particulièrement aux latérales terminées d'un bord plus ou moins large de brun roux. Aile 4 pouces. Queue 16 lignes. Tarse 17 lignes. Bec 8 lignes.

Observée dans l'île de Bangka.

1. Individu adulte, figuré dans Schlegel, Vog. Ned. Indië,

Pitta, pl. 2, fig. 1; île de Bangka, présenté en 1861, par Mr. J. F. R. S. van den Bossche. — 2. Idem, même origine.

PITTA CUCULLATA, Hartlaub. — *Pitta malaccensis*, Müller et Schlegel, Verh. Ned. O. Bez., Pitta, p. 115.

Semblable, par sa taille, à la *Pitta bangkana*, mais à bec d'un brun sale-rougeâtre, au lieu de noir; et avec une calotte d'un brun-rouge occupant le sommet de la tête et l'occiput.

Observée dans la presqu'île de Malacca.

1. Adulte, Malacca. — 2. Adulte, Malacca: plumes du dos et en partie aussi les scapulaires, chacune, avec une tache longitudinale noirâtre.

b. Pennes de la queue d'un vert sale et foncé.

PITTA NOVAE GUINEAE, Müller et Schlegel, Verh. Ned. O. Bez., Pitta, p. 19. — *Pitta atricapilla*, Quoy et Gaimard, Astrol., Ois., pl. 8, fig. 3.

Teintes vertes très foncées et passant au bleu sur le ventre. Le bleu-blanc des couvertures supérieures de la queue très restreint ou nul. Taches blanches des rémiges très étroites. — Aile 3 pouces 5 lignes. Queue 14 lignes. Tarse 16 lignes.

Observée à la Nouvelle Guinée et aux îles Arou.

1. Adulte, figuré dans Schlegel, Vog. Nederl. Ind., Pitta, pl. 2, fig. 4: îles Arou, voyage de Wallace, acquis en 1860.

^{2/3} PITTA MELANOCEPHALA, ^{Müller et Schlegel} Forsten (sed non Wagler), Müll. et Schlegel, Verh. O. Bez., Oiseaux, Pitta, p. 19; Westerman, Bijdragen, Amsterdam, I, 1854, p. 40, Pitta, pl. 2. — *Brachyurus Forsteni*, Bonap., Consp., I, p. 256, N^o. 22.

Rémiges d'un noir uniforme sans tache blanche. Taille plus forte que dans les autres espèces vertes à tête noire.

Observée dans les parties septentrionales de l'île de Célèbes.

1. Mâle adulte, figuré par Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 2, fig. 2; Kema à Célèbes, voyage du Dr. Forsten. —

2. Femelle adulte, Tondano à Célèbes, voyage du Dr. Forsten.—
 3. Femelle, livrée en partie imparfaite, même origine que le N^o. 2.

C. Taille peu forte. Teintes très belles et diverses: à dos bleu et à ventre rouge, ou à dos rouge et à ventre bleu, ou à dos vert-jaune et à ventre noir.

^{1830.}
PITTA GRANATINA, Temminck, Pl. col. 506; Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 5, fig. 3.

Front, vertex et côtés de la tête d'un noir profond. Occiput, nuque, poitrine et ventre d'un rouge ponceau. Couvertures des ailes et une raie, longeant de chaque côté la nuque, d'un bleu de cobalt clair. Les autres parties supérieures d'un bleu foncé et pourpré. Aile 3 pouces 4 lignes; queue 14 lignes; tarse 18 lignes.

Observée dans l'île de Bornéo.

1. Mâle adulte, figuré dans Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 5, fig. 3; Banjermassing à Bornéo, voyage du Dr. Schwann. — 2. Femelle adulte, Pontianak à Bornéo, voyage de Mr. Diard. — 3. Mâle, plumage en partie imparfait, Bornéo. (2)

PITTA BAUDII, S. Müller et Schlegel, Verh. Ned. O. Bez., Oiseaux, Pitta, p. 10, pl. 2; Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 5, fig. 1 et 2.

Dessus de la tête et nuque d'un bleu-verdâtre clair et métallique. Côtés de la tête et du cou, ainsi que le jabot noirs. Gorge blanche. Dos rouge de minium. Queue bleue. Poitrine et ventre d'un bleu pourpré. Ailes noires, mais à couvertures moyennes bordées de blanc. Aile 3 pouces 6 lignes; queue 15 lignes; tarse 17 lignes.

Habite l'île de Bornéo.

1. Mâle au plumage parfait, figuré par Müller et Schlegel, l. c., pl. 5, fig. 1: Bornéo, voyage du Dr. Schwann. — 2. Jeune mâle en mue, même origine que le N^o. 1. — 3. Jeune mâle,

Bornéo. — 4. Jeune femelle, Bornéo : individu figuré par Schlegel, l. c., pl. 5, fig. 2.

PITTA IRIS, Gould, Birds of Austr., vol. IV, pl. 3.

Tête, cou et dessous jusqu'au bas-ventre d'un noir, interrompu sur l'occiput par une tache rousse se prolongeant de chaque côté au dessus de l'oeil. Dessus, à partir de la nuque, et en grande partie les ailes d'un vert olivâtre clair; mais le haut des ailes d'un bleu métallique tirant, vers le devant, au vert-blanc. Abdomen et couvertures inférieures de la queue d'un rouge ponceau. Aile 4 pouces.

Observée dans le Nord de l'Australie.

1 et 2. Adultes, (Port Essington,) Australie.

D. Queue d'un bleu d'indigo tirant au blanchâtre. Dos et ailes de cette même teinte ou d'un vert-olivâtre. Une large écharpe d'un bleu blanchâtre, verte vers les côtés, occupe une partie du jabot et de la poitrine. Les autres parties inférieures en arrière de cette écharpe d'un rouge ponceau. Tête et nuque plus ou moins teintées de roux-jaune rougeâtre.

PITTA CELEBENSIS, Forsten, in-litteris; Müller et Schlegel, l. c., p. 18; Westerman, l. c., p. 46, pl. 3; Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 4, fig. 4 et 5.

Une raie bleuâtre le long de la ligne médiane de la tête. Gorge et côtés de la tête d'un brun-gris rougeâtre. Dos et scapulaires d'un vert olivâtre. Teinte des ailes semblable à celle de la queue avec ses couvertures supérieures, c'est à dire d'un bleu d'indigo tirant au blanchâtre. Écharpe bleue du jabot bordée largement de noir par devant et par derrière. Deuxième, 3^{me} et 4^{me} des grandes rémiges avec une tache blanche. Aile 3 pouces 10 lignes; queue 17 lignes.

Observée dans le Nord de l'île de Célèbes.

1. Mâle adulte, individu figuré dans Westerman et dans Schlegel, l. c.; Nord de Célèbes, voyage du Dr. Forsten. —

2. Mâle adulte, même origine que le N°. 1. — 3. Jeune mâle, commençant à endosser la livrée parfaite, même origine que les N°. 1 et 2. — 4. Jeune, première livrée, Menado à Célèbes, présenté p. 1. Soc. Zool. d'Amst., 1862. *Type fig. 1 vol. 1. pl. 4*

Temm. 1834
PITTA MACKLOTHII, S. Müller et H. Schlegel, *(1839-44)* l. c., p. 18; Temminck, Pl. col. 547; Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 4, fig. 3.

Semblable à la Pitta celebensis, mais elle est d'une taille plus forte, la gorge est noire, le front et le sommet de la tête sont noirâtres; les plumes le long de la ligne médiane de ces parties sont bordées de rose; la nuque est d'un roux rougeâtre ardent et ce sont la troisième, la 4^{me} et 5^{me} des grandes rémiges qui offrent une tache blanche. Dos et ailes comme dans la Pitta celebensis. Aile 4 pouces; queue 17 lignes; tarse 18 lignes.

Observée à la Côte Ouest de la Nouvelle Guinée.

1. Mâle adulte, figuré dans Temm., l. c., et dans Schlegel, l. c.: tué le 26 Août 1828, Baie Lobo, voy. de Mr. S. Müller.

PITTA RUFIVENTRIS. — Coloburis rufiventris, Heine dans Cabanis, Journal f. Ornith., 1859, p. 406. — Pitta inornata, G. R. Gray, Proceedings Zoolog. Society London, June 26, 1860, p. 10.

En général semblable à la Pitta celebensis: mais à taille un peu moins forte; sans raie bleue le long de la ligne médiane du sommet de la tête; sommet de la tête et nuque d'un roux plus ardent; ailes, comme le dos, d'un vert olivâtre; écharpe bleuâtre de la poitrine sans bordure noire par devant, et avec une bordure noirâtre peu large par derrière; 3^{me} et 4^{me} des rémiges avec une tache blanche. Aile 3 pouces 3 lignes à 3 pouces 6 lignes.

Observée dans les îles de Batjan et de Halmahera.

1 et 2. Mâles adultes, tués, le N°. 1 en Janvier, le N°. 2 en Mars 1861, Batjan, voyage du Dr. Bernstein. — 3. Mâle adulte, tué le 26 Avril 1862, Dodingo, Côte ouest de Halmahera.

hera, voyage du Dr. Bernstein. — 4 et 5. Mâles adultes, tués le 25 Juillet 1861, Galéla, Côte Nord-Est de Halmahera, voyage de Bernstein. — 6 et 7. Femelles adultes, tuées en Mars 1861, Batjan, voyage de Bernstein. — 8. Femelle adulte, tuée le 9 Juillet 1861, Galéla à Halmahera, voyage de Bernstein. — 9. Femelle adulte, tuée le 1 Août 1861, même origine que le N°. 8. — 10. Mâle, passage du premier habit à la livrée parfaite, tué le 26 Avril 1862, Dodingo à Halmahera, voyage de Bernstein. — 11. Jeune mâle, premier habit, avec quelques plumes de la livrée parfaite sur la poitrine et le ventre, tué le 10 Août 1861, Galéla à Halmahera, voyage du Dr. Bernstein. — 12. Jeune femelle, première livrée, tuée le 9 Juillet 1861, même origine que le N°. 11.

PITTA CYANONOTA, G. R. Gray, Proceed. Zool. Soc. London, June 1860, p. 11.

Taille et distribution des teintes comme dans la *Pitta rufiventris*; mais le vert du dos et de la face supérieure des ailes remplacé par un bleu d'indigo sombre et tirant fortement au blanchâtre. — Notez que l'expression de Mr. Gray «very similar to the former species» se rapporte à sa *Pitta inornata* et non pas à la *Pitta maxima*.

Observée dans l'île de Ternate.

1. Mâle adulte, tué le 29 Mars 1862, Ternate, voyage du Dr. Bernstein. — 2. Femelle adulte, tuée le 8 Mars 1862, même origine que le N°. 1.

Ternate 1823.
PITTA ERYTHROGASTER, ~~G. Cuvier~~; Temminck, Pl. col. 212.

Front et sommet de la tête noirâtre, avec une raie médiane d'un roux semblable à celui des autres parties de la tête. Bandelette noire en arrière de l'écharpe du jabot, ou très peu prononcée ou nulle. Une écharpe bleuâtre séparant le dos et la nuque. — Aile 3 pouces 7 lignes.

Habite les Philippines.

1 et 2. Adultes, Philippines, voyage de Mr. Cuming.

3. Jeune, en partie dans la livrée parfaite, Philippines, voyage de Cuming, acquis en 1861 de Mr. Frank.

E. Couvertures des ailes, croupion et couvertures supérieures de la queue d'un bleu de cobalt ardent et pourpré. Dos et scapulaires olivâtres. Pennes de la queue noires, terminées de bleu-verdâtre. Teinte dominante des parties inférieures d'un jaune brunâtre. Taille moyenne.

PITTA CYANOPTERA, Temm., ⁽¹⁸²³⁾ Pl. col. 218; Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 4, fig. 1.

Bec d'un brun rougeâtre foncé, plus court que la tête. Noir de la nuque et des côtés de la tête se prolongeant sous le menton, et séparé du vert du dos par une bande claire venant des côtés du cou. Dessus de la tête d'un brun rous-sâtre, séparé en arrière du front par une large raie médiane noire, qui se réunit au noir de la nuque. Aile 4 pouces et demi. Bec 11 lignes.

Habite l'île de Sumatra. On dit qu'elle vient également de Malacca. *F est Type von Turdus malaccensis (Mac) Tem. 52 p. 91 N: 129 (no locality!)*

1. Mâle adulte, Sumatra, acquis en 1861: figuré dans Schlegel, l. c., pl. 4, fig. 1. — 2. Mâle adulte, Padang à Sumatra, voyage de Mr. S. Müller. — 3. (Femelle) adulte (Sumatra) ¹⁸²⁶. — 4. Mâle adulte, acquis de Mr. Frank, comme provenant du Continent de l'Inde. — 5. Femelle adulte, acquise de Mr. Frank, comme provenant de Malacca.

PITTA MEGARHYNCHA, Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 4, fig. 2.

Semblable à la Pitta cyanoptera, mais son bec est beaucoup plus long et noir, le brun roux du dessus de la tête s'étend jusque à la fin de la nuque et n'est pas interrompu par une raie noire. Nuque bordée par derrière de noir. Le noir des côtés de la tête ne se prolongeant pas sous le menton. — Bec 16 lignes.

Observée dans l'île de Bangka. (*Malacca à Terni-france*)

1. Individu figuré dans Schlegel, l. c. : Bangka, présenté en 1861 par Mr. J. F. R. S. van den Bossche.

F. Haut des ailes et couvertures supérieures de la queue d'un vert blanchâtre métallique. Reste du dos et des ailes en grande partie vert. Teinte dominante des parties supérieures jaune brunâtre. Tête et nuque d'un noir, se prolongeant dans plusieurs espèces, jusque sur le menton ou la gorge, mais toujours interrompu de chaque côté du sommet de la tête par une raie claire, quelquefois très large.

a. Menton avec un plastron noir plus ou moins étendu.

* PITTA STREPITANS, Temminck, { Pl. col. 333 ; Gould, Austr., pl. 4, fig. 1.

Taille assez forte. Plastron noir du menton occupant toute la gorge, et s'étendant jusque sur le jabot. Dessus de la tête et occiput d'un rouge brun, divisé le long de la ligne médiane, par une raie noire. Milieu de l'abdomen noir. Pennes de la queue noires à la moitié basale, d'un vert olivâtre vers l'extrémité. Aile 4 pouces 9 lignes.

Habite l'Australie.

1. Mâle adulte, rivière Clarence, Australie. — 2. Mâle adulte, Australie. — 3 et 4. Femelles adultes, Australie.

PITTA CONCINNA, Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1857, p. 65 ; Schlegel, Vog. Ned. Ind., pl. 3, fig. 1. — Pitta Mathildae, Verreaux, Revue et Mag. de Zool., 1858, p. 303, pl. 2. — Brachyurus Vigorsii, Bonap., Consp., p. 255, N° 12, mais non pas Pitta Vigorsii de Gould.

Semblable à la Pitta strepitans par le large plastron noir de la gorge, et les teintes en général ; mais d'une taille beaucoup moins forte, et très différente par la teinte brune du dessus de la tête, qui est plus claire et ne s'étend en arrière que

jusqu'à l'occiput d'où elle se prolonge, de chaque côté, en une raie d'un blanc bleuâtre. — Aile 3 pouces 9 lignes.

Observée dans les îles de Soumbawa et de Lombok.

1. Mâle adulte, Bima à Soumbawa, voyage du Dr. Forsten : type du *Brachyurus Vigorsii* de Bonaparte. — 2. Femelle adulte, même origine que le N^o. 1 : figuré dans Schlegel, l. c.

PITTA BRACHYURA, Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 5, fig. 2 et 3. — Le Merle verd des Moluques, *Merula viridis moluccensis*, Brisson, II, p. 316, pl. 32, fig. 1. — *Corvus brachyurus*, Gmelin, I, p. 375, N^o. 15. — *Pitta irena*, Müller et Schlegel, Verh. O. Bez., Oiseaux, Pitta, p. 12. — Brève irène, *Pitta elegans*, Temm., Pl. col. 581. 1836.

Plastron noir ne s'étendant que depuis le menton jusque sur la partie antérieure de la gorge. Teinte claire du dessus de la tête bornée à deux raies d'un brun jaunâtre s'étendant de chaque côté depuis le front jusqu'à la nuque. Bordure verte des pennes caudales étroite. Aile 4 pouces à 4 pouces et 2 à 4 lignes.

Observée dans les îles de Timor et de Ternate.

1. Mâle adulte, figuré dans Temminck, l. c., pl. 581; Timor, voyage du Dr. S. Müller. — 2. Femelle adulte, figuré dans Schlegel, l. c., tuée en Novembre 1828, Timor, voyage de S. Müller. — 3. Jeune femelle, tuée en Juin 1829, Timor, voyage de S. Müller. — 4. Mâle adulte, tué le 5 Mai 1861, Ternate, voyage du Dr. Bernstein.

5. Squelette, Timor, voyage de S. Müller.

b. Gorge et menton sans plastron noir.

PITTA VIGORSII, Gould (sed non Bonaparte), Birds of Australia, vol. IV, pl. 2; Schlegel, Vog. van Ned. Ind., Pitta, pl. 5, fig. 2 et 3. — *Pitta brachyura*, Vigors (sed non auctorum).

Taille et teintes comme dans la *Pitta brachyura*, mais sans plastron noir à la gorge et les raies claires de la tête plus étroites.

Habite l'Archipel Indien.

1. Adulte, figuré dans Schlegel, l. c. : présenté et rapporté de ses voyages dans l'Archipel Indien par le professeur de. Vriese.
ma (2.) ex Edw. Pl. 324

PITTA MALACCENSIS. — *Turdus malaccensis*, Scopoli (reposant sur la Brève de Malacca, Sonnerat, Indes pl. 101); mais non pas *Pitta malaccensis*, Gray. — *Corvus bengalensis*, Gmelin, l. c., p. 376. — *Pitta brachyura*, Gray, et plurim. auctorum. — *Pitta bengalensis*, Vieillot. — *Brachyurus bengalensis*, Bonaparte, *Conspectus*, I, p. 254. — *Pitta maculata*, Temminck; Bonaparte, *ibid.* (variété à mèches noirâtres sur les plumes des parties supérieures).

Une large raie de brun-jaune clair s'étendant de chaque côté du dessus de la tête depuis le front jusque vers la fin de la nuque, mais bordée, sur les côtés de l'occiput et de la nuque, par une raie étroite d'un blanc bleuâtre. Bec d'un brun très clair, mais brun foncé le long des côtés des mandibules. Aile 3 pouces 10 lignes à 4 pouces.

Habite le Continent de l'Inde et l'île de Ceylan.

101 et 102. Turdus malaccensis Malacc. 1803.

1 et 2. Mâles adultes, Colombo à Ceylan, voyage de Mr. Diard, 1858. — 3, 4 et 5. Femelles adultes, même origine. — 6 et 7. Femelles, Continent de l'Inde. — 8. Mâle, offrant quelques plumes scapulaires et du haut de l'aile pourvues de taches noirâtres; Continent de l'Inde. — 9. Femelle adulte, semblable au N^o. 8, mais à taches noirâtres répandues sur le dos et les couvertures supérieures de la queue; Inde continentale. — 10. Mâle, à taches noirâtres des parties supérieures très prononcées, Continent de l'Inde: c'est avec les N^o. 8 et 9 le type de la *Pitta maculata* de Temminck. *ma (2.) ex Edw. Pl. 324*

101 et 102. Turdus malaccensis Malacc. 1803.
PITTA ANGOLENSIS, Vieillot. — *Pitta pulih*, Fraser. 1842.

Très reconnaissable à sa gorge rose, les couvertures claires terminées de vert-bleu blanchâtre, et les pennes caudales d'un noir uniforme. — Aile 4 pouces.

Habite l'Afrique occidentale.

1. Femelle adulte, tuée en Février 1843, Côte d'or, voyage de Mr. Pel. — 2. Femelle adulte, même origine que le N^o. 1.

II. Queue plus allongée que d'ordinaire et plus ou moins cunéiforme.

a. Queue faiblement cunéiforme.

Tem.
PITTA VENUSTA, (S. Müller in litteris) Temminck, Pl. col. 590; Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 5, fig. 4 et 5. — Brachyurus venustus, Bonap., Consp., I, p. 255.

Teinte générale d'un brun pourpré violâtre; mais la poitrine et le ventre d'un rouge ponceau, une raie d'un bleu de cobalt clair le long des côtés de l'occiput et de la nuque, et les grandes couvertures des ailes bordées de bleu. Premier plumage brun de canelle noirâtre. — Aile 3 pouces 9 lignes. Queue 2 pouces.

Habite l'île de Sumatra.

1. Mâle adulte, figuré par Temminck, l. c., et par Schlegel, l. c., pl. 5, fig. 4, tué en Juin 1834, Batang Singalang, Côte Sud-Ouest de Sumatra, voyage de Mr. S. Müller. — 2. Jeune femelle, figurée dans Schlegel, l. c., pl. 5, fig. 5; même origine que le N^o. 1.

b. Queue fortement cunéiforme. Gorge blanchâtre. Reste de la tête noir, avec une large raie surciliaire jaune. Queue d'un bleu de cobalt foncé. Ailes noires, à couvertures moyennes blanches.

(Brid)
PITTA CYANURA, Vieillot, Galerie, pl. 153; Schlegel, Vog. Ned. Ind., Pitta, pl. 6, fig. 1, 2 et 3. — Turdus cyanurus, Gmelin.

Au bas de la gorge une écharpe bleue. Jabot, poitrine et ventre ornés de bandelettes alternes d'un jaune citron et bleu-noir. Dessus de la tête roux chez les femelles dans la livrée de passage. — Aile 4 pouces. Queue 2 pouces 3 lignes.

Habite l'île de Java.

[1. Mâle adulte, Java : individu figuré par Schlegel, l. c., pl. 6, fig. 1. — 2. Mâle adulte, tué en Juillet 1826, Mont Salak à Java, voyage de Boié. — [3. Femelle, livrée de passage, Java : individu figuré par Schlegel, l. c., pl. 6, fig. 2. — 4. Femelle, livrée de passage, tuée en Décembre 1826, Buitenzorg, Java, voyage de Boié. — 5. Mâle, au passage de la première livrée à la livrée parfaite, tué en Juillet 1826, Tapos à Java, voyage de Boié. — 6. Jeune, première livrée, Java : individu figuré par Schlegel, l. c., pl. 6, fig. 3.

7. Squelette, Java, voyage de Kuhl et van Hasselt.

Bh.
PITTA SCHWANERI, Temminck, Mus. Nederl.; Bonaparte, *Conspectus*, I, p. 256; Schlegel, *Vog. Ned. Ind.*, Pitta, pl. 6, fig. 4.

Voisin de la Pitta cyanura, mais la teinte jaune plus foncée, les bandelettes bleu-noires plus étroites et au lieu d'une écharpe bleue au bas de la gorge, une large tache bleue occupant le milieu de la poitrine et du ventre. — Aile 3 pouces 7 lignes; queue 2 pouces 3 lignes.

Observée dans les parties méridionales de l'île de Bornéo.

1. Mâle adulte, Banjermassing à Bornéo, voyage de Schwanner. — 2. Femelle adulte, même origine que le N°. 1 : individu figuré par Schlegel, pl. 6, fig. 4. — 3. Jeune mâle, même origine que les N°. 1 et 2.

Text. Pl. col. 1836 *Burdoux & Savoyat 1841*
PITTA ELEGANS, Lesson, *Bonite, Oiseaux*, pl. 3. — Brève élégant, Pitta [elegant, Temminck, *Pl. col.* (descr. sans figure); Schlegel, *Vog. Ned. Ind.*, Pitta, pl. 6, fig. 5. — Pitta Bosschii, Müller et Schlegel, *Verh. O. Bez.*, Pitta, p. 5, pl. 1. 1837-41

Raies de la tête très larges par derrière et passant au rouge de feu. Poitrine et ventre d'un bleu pourpré foncé. Jabot orné de bandelettes noires, bleues et d'un rouge de minium. Une écharpe noire au bas de la gorge. — Aile 4 pouces; queue 2 pouces 3 lignes.

Habite l'île de Sumatra.

1. Adulte, Sumatra, 1862: individu figuré dans Schlegel, l. c., pl. 6, fig. 5. —
2. Adulte, Sumatra, présenté par Mr. van der Vinnen: individu figuré par Müller et Schlegel, l. c. —
5. Individu dans la livrée de passage, même origine que le N°. 2.

R É S U M É.

		Indiv. montés.	Squelettes.
<i>Pitta coerulea.</i>	p. 1.	4	
" <i>maxima.</i>	" 2.	6	
" <i>nipalensis.</i>	" 2.	1	
" <i>philippensis.</i>	" 2.	2	
" <i>atricapillá.</i>	" 3.	5	1
" <i>bangkana.</i>	" 3.	2	
" <i>cucullata.</i>	" 4.	2	
" <i>novae Guineae.</i>	" 4.	1	
" <i>melanocephala.</i>	" 4.	3	
" <i>granatina.</i>	" 5.	3	
" <i>Baudii.</i>	" 5.	4	
" <i>iris.</i>	" 6.	2	
" <i>celebensis.</i>	" 6.	4	
" <i>Macklotii.</i>	" 7.	1	
" <i>rufiventris.</i>	" 7.	12	
" <i>cyanonota.</i>	" 8.	2	
" <i>erythrogastra.</i>	" 8.	3	
" <i>cyanoptera.</i>	" 9.	5	
" <i>megarhyncha.</i>	" 9.	1	
" <i>strepitans.</i>	" 10.	4	
" <i>concinna.</i>	" 10.	2	
" <i>brachyura.</i>	" 11.	4	1
" <i>Vigorsii.</i>	" 11.	1	
" <i>malaccensis.</i>	" 12.	10	
" <i>angolensis.</i>	" 12.	2	
" <i>venusta.</i>	" 13.	2	
" <i>cyanura.</i>	" 13.	6	1
" <i>Schwaneri.</i>	" 14.	3	
" <i>elegans.</i>	" 14.	3	
<hr/>		<hr/>	<hr/>
29 <i>specimen</i>		100	3
Total 103 échantillons.			