

A S T U R I N A E

PAR

H. SCHLEGEL.

Septembre 1862.

Cette famille, composée d'un petit nombre d'espèces habitant toutes l'Amérique chaude, tient en général, et plus particulièrement par les proportions relatives de leur queue et de leurs ailes, le milieu entre les Autours et les Buses.

A. Asturines proprement dites.

ASTURINA NITIDA, Kaup. — *Falco nitidus*, Latham, Pl. col. 87 (ad.) 294 (jeune) *).

Aile 8 pouces et demi à 9 pouces et demi. Tarse 2 pouces

*) **ASTURINA PLAGIATA**. — *Falco (Buteo) plagiatus*, Licht., Nomencl. Mus. Berol., p. 3.

Cette espèce, très voisine de l'*Asturina nitida*, s'en distingue par une taille plus forte, par des tarses et des ongles beaucoup plus robustes, et par un plus grand nombre de bandes caudales. — Le Musée de Berlin, où j'ai vu cette espèce, en possède deux individus, mâle et femelle, apparemment dans la première livrée et recueillis près de la Vera Cruz au Mexique. Long. tot. 16 $\frac{1}{2}$ à 18 pouces. Aile 10 pouces 3 lignes à 10 pouces 6 lignes. Pointe de l'aile 3 pouces. Queue 7 pouces à 7 pouces 3 lignes. Tarse 2 pouces 8 lignes, gros de 4 lignes, emplumé sur les deux premiers cinquièmes de sa longueur et revêtu de onze plumes. Doigt du milieu 1 pouce 8 lignes. Ongle de ce doigt 9 lignes et demie.

et demi. Doigt du milieu un pouce 4 à 5 lignes. Queue 5 $\frac{1}{2}$ à 6 p. Ailes aboutissant au milieu de la queue. Quatrième rémige dépassant à peine la troisième et la cinquième. Hauteur de la mandibule supérieure 3 lignes et demie à 4 lignes et demie. — Adulte: d'un gris blanchâtre, relevé de toute part à l'exception de la gorge, par des bandelettes transversales d'un gris bleuâtre, nombreuses et très serrées; couvertures inférieures de la queue blanches; queue noire avec trois bandes blanches, dont les deux antérieures sont composées de taches. — Jeune: tête, cou et parties inférieures d'un jaune roussâtre très vif et ornés, depuis la poitrine jusqu'à l'anus, de larges taches longitudinales d'un brun-roux foncé mais ardent; cette teinte occupe aussi le dos et les ailes, dont les plumes sont bordées de roux; queue d'un brun noir, avec cinq à six bandes grisâtres.

Observée au Paraguay, au Brésil, à la Guyane et en Colombie. — Schomburgk, p. 757, rapporte qu'elle ressemble par sa manière de vivre à l'*Asturina magnirostris*, et qu'elle se nourrit d'insectes, de reptiles et de petits oiseaux.

1 et 2. Femelles au plumage parfait, Surinam. — 3. Mâle en mue: passage de la première livrée à la livrée parfaite, Surinam. — 4. Mâle dans la première livrée, Cayenne. — 5. Mâle dans la première livrée, Surinam.

ASTURINA UNICINCTA. — *Astur uncinctus*, G. Cuvier. — *Falco uncinctus*, Temm., pl. col. 515. — *Buteo Harrisii*, Audubon, pl. 392.

Bec très robuste, long de 11 lignes; hauteur de la mandibule supérieure 6 lignes. Pieds jaunes. Troisième rémige dépassant à peine la quatrième. Ailes recouvrant la moitié de la queue. — Dessus d'un brun passant, sur la queue, au grisâtre. Plumes des ailes rousses à la base, avec de fines bandes brunes. Rémiges secondaires, chacune, avec huit bandes brunes très étroites. Queue avec douze bandes brunes en chevron, la dernière très large et bordée de blanc. Plumes de la tête et du cou brunes, bordées de blanchâtre. Dessous blanc, avec de larges taches longitudinales brunes, en goutte sur le ventre. Culottes avec des lignes brunes ondulées, dont on voit aussi quelques unes sur les grandes couvertures inférieures de la queue.

Très reconnaissable à son bec en partie jaunâtre, aux proportions de ses parties et à ses teintes. Doigts presque aussi développés que dans l'autour. Tarses robustes. Ailes recouvrant environ la moitié de la queue. Longueur totale 18 à 21 pouces. Aile 12 pouces à 13 pouces et demi. Queue 8 à 9 pouces. Tarse environ de 3 pouces. Doigt du milieu 19 à 21 lignes. Teinte générale d'un brun foncé tirant au roux. Petites couvertures des ailes et culottes d'un roux foncé. Couvertures supérieures et inférieures de la queue blanches. Premier tiers de la queue et une bande terminale, large d'un pouce, d'un blanc plus ou moins pur; la face inférieure de la queue en outre avec de nombreuses bandelettes claires. Les plumes des parties inférieures ont, dans les individus de l'année, de larges bordures d'un jaune roussâtre pâle. Pieds jaunâtres. Bec d'un jaunâtre, tirant au noirâtre à la base et à la pointe du bec.

Habite l'Amérique chaude.

1. Mâle adulte, Chili, acquis de Mr. Frank en 1858. —
2. Mâle au premier plumage, Mexique, par Mr. Frank, 1860.
3. Femelle au premier plumage, Buenos-Ayres, par Mr. Verreaux.

ASTURINA MAGNIROSTRIS. — *Asturina* (*Rupornis*) *magnirostris*, Kaup. — *Falco magnirostris*, Gmelin; Pl. enl. 464; Pl. col. 86.

Long. tot. 13 à 15 pouces. Aile 8 pouces à 8 pouces et demi. Pointe de l'aile 18 à 26 lignes. Queue 5 pouces 6 lignes à 6 pouces. Tarse 26 à 28 lignes. Doigt du milieu 12 à 14 lignes. Ailes aboutissant à la moitié de la queue. Reconnaissable à sa taille et à ses rémiges teintes, à la moitié antérieure, de brun-rouge clair, interrompu par des bandes noires. Adulte: cire et pieds d'un jaune orangé; tête, cou et jabot d'un gris cendré; poitrine et ventre d'un gris roussâtre, avec des bandes blanches; couvertures inférieures de la queue blanches; queue blanche à l'extrémité, et portant quatre larges bandes grises. — Jeune: dessus brun; dessous d'un blanc jaunâtre,

avec des taches longitudinales brunes, en coeur élargi sur les flancs; couvertures inférieures de la queue blanches; plumes des jambes d'un roux clair, avec des bandes foncées. — Habit de passage: tête, cou, manteau et ailes bruns; dessous blanc, avec des taches d'un roux foncé, longitudinales sur le jabot, en forme de bandes transversales sur les autres parties; queue souvent d'un roux pâle.

Observée au Mexique, en Colombie, à la Guyane et au Brésil. Se nourrit de campagnols, de jeunes oiseaux, de sauterelles, de mollusques et de vers. Se tient de préférence dans les bois ou buissons proches des plaines. Guette sa proie, perchée sur une branche inférieure des arbres. Voix semblable à celle de la buse commune. Elle a le vol léger, mais elle ne s'élève que rarement à de grandes hauteurs dans les airs. — On la trouve, suivant Schomburgk, p. 737, en grand nombre le long des côtes de la mer, dans les forêts peu touffues et dans les plantations de café. Elle aime à se percher sur les branches inférieures des arbres, et construit son aire, faite de minces rameaux, sur des arbres peu élevés.

1 et 2. Femelles au plumage parfait, Caracas, présentées par Mr. van Lansbergen. — 3. Femelle, habit de passage, Costa Rica, obtenue en 1862 du Musée de Berlin. — 4 et 5. Mâles au plumage parfait, Caracas, présentés par Mr. van Lansbergen. — 6. Mâle au plumage parfait, Surinam. — 7. Mâle au plumage parfait, Brésil. — 8. Mâle au premier plumage, Brésil; individu figuré dans les Pl. col. 86.

ASTURINA GULARIS. — Falco (Rupornis) gularis, Licht., Nomencl., p. 3.

Très voisine de l'Asturina magnirostris, dont elle se distingue par une taille un peu plus forte et, dans l'âge adulte, par quelques modifications dans les teintes des parties inférieures: le jabot, la poitrine et le ventre tirant plus ou moins au roux jaunâtre; les mèches sur le jabot sont d'un roussâtre très clair, et les raies transversales de la poitrine et du ventre sont éga-

lement plus claires. La tête et le cou sont quelquefois d'un brun assez foncé. — Longueur totale 16 pouces. Aile $9\frac{1}{2}$ à 10 pouces; pointe de l'aile 3 pouces. Queue 6 pouces à 6 pouces et demi. Tarse 2 pouces 6 lignes à 2 pouces 8 lignes. Doigt du milieu 15 à 17 lignes.

Observée près de Montévidéo et de Buenos-Ayres.

1. Femelle au plumage parfait, à tête et cou bruns; Buenos-Ayres, acquise de Mr. Verreaux. — 2. Individu au premier plumage, Rio de la Plata.

ASTURINA LEUCORRHOA, Kaup, Isis, 1847, p. 199. — Falco leucorrhous, Quoy et Gaimard, Uranie, pl. 13.

Longueur totale 14 pouces. Aile 8 pouces à 8 pouces et demi. Pointe de l'aile 2 pouces 4 lignes. Queue 5 à 6 pouces. Tarse 2 pouces, emplumé par devant, dans la moitié de sa longueur, et revêtu de 9, par derrière de 11 plaques. Doigt du milieu 15 lignes. Mandibule supérieure longue de 7, haute de 4 lignes. Quatrième rémige dépassant de très peu les autres. Ailes recouvrant la moitié de la queue. Pieds jaunes. Bec peu arqué, noirâtre. Adulte: d'un noir tirant au brun pourpré; queue blanche dans le premier quart de sa longueur; une bande étroite d'un blanc brunâtre sur le commencement du dernier tiers de la queue; couvertures inférieures de la queue et grandes couvertures supérieures latérales d'un blanc pur; plumes des jambes variées de roux foncé; couvertures inférieures de l'aile d'un blanc roussâtre. Les jeunes diffèrent en ce que les plumes du dessous offrent de larges bordures d'un jaune d'ocre et que la queue est ornée de quatre bandes brunes peu distinctes.

Habite le Brésil (Musées de Paris, de Bruxelles, de Berlin).

1. Individu au premier plumage, Brésil.

B. Les Asturines-Aigles. Ailes longues.

ASTURINA MELANOLEUCA. — Spizaëtus melanoleucus, Vieillot. — Falco aguia, Temm., Pl. col. 302. — Haliaëtus aguia,

G. Cuvier. — *Cuncuma aguia*, G. R. Gray. — *Buteo aguia*, Cabanis. — *Haliaëtus* (*Heteroaëtus*) *aguia*, Kaup.

Longueur totale 23 à 24 pouces; aile 18 à 20 pouces; queue 9 pouces à 9 pouces et demi; tarse 4 pouces. Doigt du milieu 2 pouces. — Teintes de l'adulte rappelant en général celles de l'*Asturina nitida* au plumage parfait: dessous, à partir de la poitrine, d'un blanc orné souvent de lignes ondulées, transversales, noirâtres; région des freins et gorge d'un blanc uniforme; poitrine, jabot, sommet de la tête, cou, dos, rémiges et queue couleur de schiste noirâtre; couvertures de l'aile grises avec des bandes transversales noirâtres. Teintes des jeunes très semblables à celles de l'*Asturina urubitinga* au premier plumage.

Observée aux Guyanes, au Brésil, au Chili et en Patagonie.

1. Mâle au plumage parfait, à poitrine, ventre et culottes d'un blanc uniforme; Brésil. — 2. Mâle au premier plumage, semblable au N°. 1, mais à teintes plus foncées et à parties inférieures finement rayées de travers, Paraguay, obtenu en 1835. — 3. Femelle au plumage parfait; teintes à peu près semblables au N°. 1; mais plus foncées et en général comme dans l'individu figuré par Temm., Pl. col. 102; Brésil, acquise en 1835. — 4. Femelle au passage de la première livrée à la livrée parfaite, Brésil. — 5 et 6. Femelles dans la première livrée, Brésil. — 7. Mâle dans la première livrée, Quito, acquis de Mr. Frank, 1860.

C. Les Asturines-Buses. Plumage des adultes noir, queue avec une bande blanche.

ASTURINA URUBITINGA. — *Asturina* (*Rupornis*) *urubitinga*, Kaup. — *Hypomorphnus urubitinga*, Cabanis. — *Morphnus urubitinga*, Cuv. — *Falco urubitinga*, Gmelin; Temm., Pl. col. 55.

Reconnaissable à sa forte taille comme à ses tarsi allongés et, à l'âge adulte, à sa queue blanche à la moitié antérieure. Long. tot. 21 à 24 pouces. Aile 14 pouces 6 lignes à 15 pou-

ces et demi. Queue 8 pouces et demi à 9 pouces et demi, pointe de l'aile 15 à 21 lignes. Tarse 4 pouces une à 5 lignes. Doigt du milieu un pouce 10 lignes à 2 pouces une ligne. Ongle de ce doigt 10 à 12 lignes. Ailes aboutissant un peu au delà du milieu de la queue. Tarses emplumés dans le premier quart de leur longueur, revêtus par devant de 15 plaques. — Adulte: cire jaune; pieds d'un jaune pâle; plumage d'un noir uniforme, interrompu sur les rémiges secondaires par des bandes grisâtres; grandes couvertures supérieures, moitié antérieure et pointe de la queue d'un blanc pur. Jeune: ailes, dos et queue d'une brun rougeâtre foncé; rémiges secondaires avec des bandes grisâtres; couvertures de l'aile avec des taches transversales rousses; les trois quarts antérieurs des pennes de la queue avec une dizaine de bandes d'un brun clair taché de noirâtre; tête, cou et toutes les parties inférieures d'un jaune-roux clair, avec des taches noires, transversales sur les jambes, longitudinales sur les autres parties. — C'est un oiseau farouche qui habite les bois et les buissons. On le voit souvent perché sur les grosses branches inférieures des arbres élevés. Sa voix, qu'il fait souvent entendre, consiste en un son aigu mais très perçant et répété souvent deux fois de suite. Il se nourrit de petits mammifères, d'oiseaux, de lézards, de serpents, de mollusques et même de sauterelles. Il niche sur les arbres élevés dans les forêts (Pr. Max.). Suivant Tschudi il n'habite, au Pérou, que la région des forêts, où il se nourrit principalement de rongeurs de petite taille; on le trouve aussi, souvent en nombre considérable, réuni autour des cadavres des animaux morts, mais il ne touche pas à la charogne. Schomburgk, p. 740, l'a observé le plus souvent dans les forêts, perché sur les branches inférieures des arbres, ou sur les arbres le long des bords des rivières. Il cherche sa nourriture ordinairement à terre; elle consiste en insectes, en oiseaux, et en petits mammifères; il attaque aussi les singes de petite taille. Il construit son nid sur des arbres élevés.

Observée au Pérou, au Brésil, au Paraguay, à Cayenne et au Mexique, d'où Mr. Deppe l'a rapporté.

1 et 2. Mâles au plumage parfait, Brésil. — 3. Femelle au plumage parfait, Brésil. — 4. Femelle au plumage à peu près parfait, Brésil. — 5. Femelle au premier plumage, Brésil. — 6. Mâle au premier plumage, Surinam. — 7. Mâle au premier plumage, Nouvelle Grenade.

ASTURINA ANTHRACINA. — *Falco anthracinus*, Lichtenstein, Mus. Berol.; Nitzsch, Pterylographie, p. 83 et 84. — *Hypomorphnus anthracinus*, Licht., Nomencl. Mus. Berol., p. 1. — *Circaëtus solitarius*, Tschudi, Fauna Peruana, pl. 2?

Semblable à l'Urubitinga, mais d'une taille moins forte, à tarses plus courts et à queue ornée d'une bande blanche au milieu. — Longueur totale 18 à 20 pouces. Aile 14 à 15 pouces. Pointe de l'aile 5 pouces. Queue 8 pouces et demi. Tarse 3 pouces à 3 pouces 4 lignes. Ailes recouvrant trois quarts de la queue. — Adulte: d'un noir uniforme; freins et base des plumes de la nuque blancs; queue pourvue, à la fin du deuxième tiers de sa longueur, d'une bande blanche, large d'un pouce, terminée de blanc à l'extrémité, et offrant, vers la base, trois bandes étroites et blanchâtres.

Observée au Mexique (Tabasco), à Carthagène, au Pérou et dans la Guyane. — Schomburgk, p. 740, rapporte que la manière de vivre de cet oiseau est absolument la même que celle de l'Urubitinga. Il habite les forêts humides, et paraît aussitôt qu'on met le feu aux herbes de la Savanne, en compagnie de l'Urubitinga, pour aller dévorer des reptiles.

1. Mâle au plumage parfait, Pérou. — 2. Femelle au plumage parfait, Mexique, acquise en 1855 de Mr. Frank. — 3. Femelle au plumage parfait, Surinam. — 4. Femelle au plumage parfait, Brésil.

ASTURINA SCHISTACEA, Sundevall, Öfv. af K. Vet. Ak. Förh.

1849. p. 152. — *Hypomorphnus ardesiacus*, Licht., Nomencl. Mus. Berol., p. 1.

Semblable à l'*Asturina anthracina*, mais d'une taille moins forte et d'une teinte moins foncée. Plumage couleur de schiste uniforme; queue avec une bande blanche étroite. — Longueur totale 18 pouces. Aile 11 pouces. Pointe de l'aile 1 pouce à 1 pouce et demi. Queue $6\frac{1}{2}$ à 7 pouces, carrée. Tarse 3 pouces à 3 pouces 3 lignes, emplumé dans le premier tiers de sa longueur, revêtu par devant de 11 grandes plaques. Doigt du milieu 15 à 18 lignes. Ailes recouvrant un peu plus de la moitié de la queue. Quatrième rémige dépassant un peu les autres. Région des freins et tour de l'oeil nus. — Adulte: d'un gris ardoisé plus ou moins noirâtre, et passant au noir sur les grandes rémiges et les penes de la queue; queue terminée de blanc et avec une bande blanche, large de 6 à 8 lignes, sur la fin du deuxième tiers de sa longueur; couvertures inférieures de la queue terminées de blanc et offrant quelquefois une bande blanche au milieu. — Le jeune a le ventre, les culottes et les couvertures inférieures de la queue ornés de fines raies transversales et ondulées.

Observée près de Para et à Cayenne: Musée de Berlin (2 indiv.), Musée de Bruxelles (1 indiv.). Habite aussi les forêts de l'intérieur du Pérou et de Bolivie (Sclater, Proceed., 1858, p. 128).

1. Adulte, Brésil, obtenu du Musée de Berlin.

D. Asturines-Pies. Espèces à plumage blanc passant sur les ailes au noir couleur de schiste, et à queue en partie noire, en partie blanche. Les espèces de cette subdivision sont faciles à reconnaître, soit à leur taille, soit à la distribution du blanc et noir, particulièrement de leur queue. Sous-genre *Leucopternis* chez Kaup.

ASTURINA ALBICOLLIS. — *Asturina* (*Leucopternis*) *albicollis*, Kaup. — *Falco albicollis*, Latham. — *Buteo albicollis*,

G. R. Gray. — *Falco picatus*, Shaw. — *Falco poecilonotus*, G. Cuvier; Temm., Pl. col. 9.

Taille de la buse commune; queue blanche avec une très large bande noire au milieu. Plumes du dos à taches noires, des ailes à taches blanches. Bec robuste. Aile 12 pouces et demi à 14 pouces. Queue 7 à 8 pouces. Tarse 3 pouces.

Observée au Brésil, dans les Guyanes et au Mexique.

1. Mâle adulte, Mexique, par Mr. Frank, 1859. — 2. Femelle adulte, Cayenne, achetée à Paris en 1835. — 3. Femelle adulte, Guyane, obtenue de Mr. Brandt de Hambourg, 1862. — 4. Femelle adulte, Surinam, obtenue en 1858.

ASTURINA MELANOPS. — *Falco melanops*, Latham; Temm., Pl. col. 105. — *Buteo melanops*, G. R. Gray.

A physionomie d'autour. Rappelant en général l'albicollis; mais à taille petite, à ailes très courtes, aux plumes du dessus de la tête et de la nuque avec des taches noires longues et étroites, et à queue noire, pourvue d'une barre blanche large d'un pouce. Aile 8 pouces à 8 pouces 5 lignes. Queue 5 pouces et demi. Tarse 2 pouces à 2 pouces 5 lignes.

Observée au Brésil, aux Guyanes, au Chili et au Mexique. — Habite, suivant Schomburgk, 737, les oases des Savannes, où on la voit perchée sur les branches des arbres près de leur cime. Se nourrit de reptiles.

1. Mâle adulte, Chili, par Mr. Frank. — 2. Femelle adulte, Chili, par Mr. Frank. — 3. Femelle adulte, Cayenne, obtenue du Musée de Paris: individu figuré dans les Pl. col. 105.

ASTURINA MELANONOTA. — *Buteo melanonotus*, Vieillot, Nouv. Dict. Déterville, vol. 4, p. 472.

Reconnaissable à sa queue, dont la moitié basale est noire, la moitié terminale blanche. Aile 14 pouces à 14 pouces et demi; pointe de l'aile 2 pouces à 5 pouces et demi. Queue 6 pouces 6 lignes à 7 pouces 4 lignes. Tarse 5 pouces 3 à 6 lignes.

Observée au Brésil. (Des individus aux Musées de Bruxelles, de Francfort et de Berlin.)

Habite le Brésil, la Guyane et le Mexique.

1. Adulte, Mexique, par Mr. Frank, 1858.

ASTURINA SCOTOPTERA. — *Falco scotopterus*, Pr. Max v. Neuwied. — *Falco lacernulatus*, Temm., Pl. col. 457. *)

Reconnaissable à sa queue blanche, mais pourvue de deux bandes noires: savoir l'une très large à la base; l'autre, étroite, près de l'extrémité de la queue. Longueur totale 16 pouces. Aile 11 à 12 pouces; pointe de l'aile 18 à 30 lignes. Queue $5\frac{2}{3}$ à 6 pouces. Tarse 3 pouces. Doigt du milieu 16 lignes. Hauteur de la mandibule supérieure 5 lignes et un tiers. Doigts garnis vers l'extrémité d'environ cinq, celui du milieu de dix plaques. Ailes recouvrant trois quarts de la queue. Tarse emplumé dans le premier tiers de sa longueur; garni, par devant, de 10 à 11 plaques dirigées un peu vers le dehors. — Pieds jaunes; iris d'un jaune brunâtre; cire d'un jaune verdâtre. Tête et cou blancs, souvent à baguettes des plumes noires. Ailes et dos couleur d'ardoise; les plumes de ces parties avec des bandes blanches à leur base. Queue blanche, mais portant, près de son extrémité, une bande étroite noirâtre, tandis que l'on voit une autre bande noirâtre très large, occupant presque toute la moitié basale de la queue. Cette bande est remplacée, à la face inférieure de la queue, par dix à douze

*) **ASTURINA GHIESBRECHTII.** — *Buteo Ghiesbrechtii*, Dubus.

Semblable aux Asturines scotoptère et melanonote; mais s'éloignant par ses ailes en grande partie blanches, et par sa queue ornée d'une bande terminale noire. — Long. tot. 21 pouces. Aile 13 pouces et demi. Pointe de l'aile 18 lignes. Tarse 35 lignes. Doigt du milieu 17 lignes. Tarses emplumés sur deux cinquièmes de leur longueur et revêtus, par devant, de 10 plaques. Ailes recouvrant deux tiers de la queue. Quatrième rémige dépassant un peu les autres. Cire et pieds jaunes. Bec et ongles noirs. — Teinte dominante d'un blanc pur. Grandes rémiges noires à leur moitié terminale. Grandes couvertures externes de l'aile noires, à pointe blanche; petites couvertures à baguettes noires. Une bande noire, large de 21 lignes, sur le dernier tiers de la queue. — Note prise au Musée de Bruxelles sur l'individu type de cette espèce, découverte au Mexique par M. Ghiesbrecht.

bandelettes très étroites. Parties inférieures de l'oiseau d'un blanc uniforme.

Observée à Cayenne, au Brésil et dans la République argentine. — Habite les forêts. Se perche sur les branches des arbres, pour guetter sa proie.

1. Mâle adulte, Brésil. — 2. Femelle adulte, Guyane.

ASTURINA SUPERCILIARIS. — *Leucopternis superciliaris*, von Pelzeln, Sitzungsbericht der K. Acad., 44, 1861, p. 10.

Rappelle l'*Asturina melanops* par sa petite taille et sa queue noire pourvue, au milieu, d'une bande étroite et blanche; mais les freins et le dessus de la tête sont noirs avec une raie surciliaire blanche, et les plumes de la nuque sont noires avec de larges bordures blanches.

Observée dans les forêts du Brésil.

1. Femelle, Para au Brésil, voyage de J. Natterer: aile 8 pouces quatre lignes; pointe de l'aile, 1 pouce et demi; queue 5 pouces 4 lignes.

E. Asturines-Circaètes. Une huppe occipitale; tarses revêtus d'un réseau d'écailles.

Aliaëtus, ^{Luft} ~~Luft~~ *Naevus*
ASTURINA CORONATA. — *Circaëtus coronatus*, G. Cuvier. — *Harpia coronata*, Vieillot. — *Falco coronatus*, Temm., Pl. col. 234. — *Asturina (Thrasaëtus) coronatus*, Kaup.

Tarses revêtus d'écailles, quelquefois plus grandes sur le devant que sur les autres parties. Une huppe occipitale assez longue. Queue carrée. Aile 20 à 21 pouces; pointe de l'aile 4 pouces. Queue 9 à 10 pouces. Tarse à peu près de 5 pouces. — Plumage gris-brun. Rémiges et queue noires; la dernière avec deux barres blanches. Rémiges du deuxième ordre moirées de gris et de noirâtre.

Observée au Brésil et au Chili.

1. Mâle, Brésil. — 2. Femelle, Chili, du Cabinet de Mr. Riocour.

[3. Squelette, Brésil, par Mr. Verreaux.

R É S U M É.

			Indiv. montés.	Squelettes.
<i>Asturina nitida.</i>	p. 1.		5	
" <i>unicincta.</i>	" 2.		3	
" <i>magnirostris.</i>	" 3.		8	
" <i>gularis.</i>	" 4.		2	
" <i>leucorrhœa.</i>	" 5.		1	
" <i>melanoleuca.</i>	" 5.		7	
" <i>urubitinga.</i>	" 6.		7	
" <i>anthracina.</i>	" 8.		4	
" <i>schistacea.</i>	" 8.		1	
" <i>albicollis.</i>	" 9.		4	
" <i>melanops.</i>	" 10.		3	
" <i>melanonota.</i>	" 10.		1	
" <i>scotoptera.</i>	" 11.		2	
" <i>superciliaris.</i>	" 12.		1	
" <i>coronata.</i>	" 12.		2	1
			<hr/>	
			51	

Total 52 échantillons.