

M E R O P S

P A R

II. SCHLEGEL.

Juni 1863.

Bec noir. Point de différence dans les formes et les teintes des deux sexes. Les jeunes ne se distinguent souvent des adultes que par des teintes moins pures; dans les espèces à pennes mitoyennes de la queue allongées, ces pennes n'acquièrent ce développement qu'avec l'âge. Les femelles sont tant soit peu plus petites que les mâles. Ces oiseaux habitent l'Afrique, l'Europe et l'Asie chaude jusqu'aux Philippines, à la Nouvelle Guinée et l'Australie. L'époque de la propagation passée, ils mènent, réunis par bandes nombreuses, une vie vagabonde, et se rendent souvent, à la recherche de leur nourriture, dans des contrées très distantes de leur séjour habituel. Nous avons cru devoir proposer une classification des espèces plus ou moins différente de celles adoptées par nos devanciers.

I. Paire mitoyenne des pennes caudales allongée dans les adultes.

A. Teinte dominante verte; gorge sans écharpe foncée.

MEROPS AEGYPTIUS, Forsk&l (juv.). — *Merops Savignyi*, Cuvier et Swainson (adult.). — *Merops persica*, Pallas. — *Mer. Vaillantii*, Bonaparte; *Consp.*, I, p. 161, N^o. 2, 3 et 4.

Teinte générale d'un vert d'herbe, tirant au bleuâtre dans la livrée imparfaite, au jaune bronzé dans la livrée parfaite. Freins et la partie supérieure de la région des oreilles d'un noir, tirant au vert dans les adultes. Front, une raie surciliaire et moustaches d'un bleu clair. Gorge d'un roux passant au jaune de citron vers le menton. Au plumage imparfait toutes les teintes sont ternes, le roux de la gorge est très pâle et s'étend sur la moustache, pour passer au blanchâtre qui occupe la moitié inférieure de la région des oreilles. Aile 5 pouces et 2 à 9 lignes. Queue, sans les pennes mitoyennes; 3 pouces et 1 à 3 lignes; les pennes mitoyennes 5 à 6 pouces. Bec, depuis le front 16 à 19 lignes.

Niche dans les Steppes entourant les lacs Caspi et Aral, et dans l'Afrique chaude; de passage dans les autres parties de l'Afrique; s'égaré même quelquefois jusque dans l'Europe méridionale.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, environs d'Orenburg, acquis en 1862. — 3. Très vieux mâle, Sénégal. — 4 et 5. Mâle et femelle adultes, Nubie, acquis en 1861. — 6. Adulte, en partie dans la livrée de passage, Égypte supérieure, présenté par Mr. Clot-Bey. — 7. Femelle, passage de la première livrée à la livrée parfaite, Nubie, acquise en 1860 de Mr. Verreaux. — 8. Individu dans la livrée imparfaite, Nubie, 1861. — 9 et 10. Individus dans la livrée imparfaite, Afrique australe, voyage de J. Verreaux, acquis en 1859. — 11. Individu dans la livrée imparfaite, Afrique australe, voyage du Dr. van Horstock. — 12. Squelette, Afrique australe. — 13. Crâne, Afr. australe.

MEROPS PHILIPPINUS, Linné. — *Merops javanicus*, Horsfield. — *Merops cyanorrhos*, Temminck.

Semblable par les teintes et leur distribution au *Merops aegyptius*; mais d'une taille moins forte, quoique la queue soit,

proportions gardées, plus longue, et à teintes vertes fortement bronzées, à l'exception du croupion et de la queue avec ses couvertures, parties qui offrent un joli bleu tirant un peu au verdâtre. Aile 4 pouces 8 lignes à 5 pouces. Queue sans les pennes mitoyennes 3 pouces et 4 à 6 lignes; pennes mitoyennes 5 pouces à 5 pouces 8 lignes. Bec 14 à 18 lignes.

Observé au Nipaul jusqu'à Malacca, à Ceylan, sur les îles de la Sonde, et aux Philippines. — Ce guépier, de passage à Java, y paraît en bandes nombreuses depuis Novembre jusqu'en Avril; durant la saison sèche, il n'en reste que quelques couples qui nichent dans les crêtes des grandes rivières. C'est ordinairement le soir que ces bandes s'annoncent par leurs cris continuels «piriek-piriek»; on les voit quelquefois voltiger près des villages, où les termites essaient, et ne continuer leur route qu'après que ces insectes ont fini leurs volées éphémères. D'autres fois ces bandes de plusieurs centaines d'individus rasant les pâturages et les plages sablonneuses, où elles font une destruction énorme de criques. Les colonnes immenses de petits diptères qui obscurcissent l'atmosphère au dessus des lacs et marais sont encore des appâts qui retiennent ces oiseaux dans leur vol errant (de Bocarmé, notes manusc.).

1 et 2. Mâles adultes. — 3, 4 et 5. Femelles adultes, Co-Jombo, Ceylan, voyage de Mr. Diard, 1859. — 6 et 7. Mâle et femelle adultes, Java, 1862. — 8. Mâle adulte, tué le 15 Octobre 1826, Buitenzorg à Java, voyage de Boié. — 9. Femelle adulte, tuée le 10 Janvier 1827, Tjikao à Java, voyage de Boié. — 10. Adulte, Bornéo méridional, voyage du Dr. Croockewit. — 11. Mâle adulte, Banjermassing, Bornéo, voyage du Dr. Schwaner. — 12. Adulte, Philippines, voyage de Cuming, 1861.

13 et 14. Squelettes, Java. — 15 et 16. Squelettes de mâle et de femelle, Java, voyage du Prof. Blume.

MEROPS BADIUS, Gmelin. — *Merops castaneus*, Latham. — *Mer. hypoglaucus*, Reichenbach, p. 76, pl. 449, fig. 5245 (juv.).

Très reconnaissable à sa gorge d'un bleu clair, mais vif, et au brun rouge foncé qui recouvre, dans les adultes, le manteau, la nuque et le dessus de la tête. Au premier plumage ces parties sont vertes. Aile 4 pouces à 4 pouces 4 lignes. Queue 2 pouces 9 lignes à 3 pouces; pennes mitoyennes 5 pouces 5 lignes. Bec 13 à 15 lignes.

Observé à Malacca, à Bangka, à Sumatra et à Bornéo.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, Mantop, Bornéo, voyage de Schwaner. — 3, 4 et 5. Adultes, Bangka, présentés par Mr. J. F. R. S. van den Bossché. — 6 et 7. Adultes, Sumatra, voyage de Mr. S. Müller. — 8. Individu dans la livrée de passage, Sumatra. — 9. Jeune, premier plumage, Sumatra, S. Müller.

10. Squelette, Sumatra, S. Müller.

B. Teinte dominante verte; une écharpe noire ou bleue au bas de la gorge dans les adultes.

MEROPS APIASTER, Linné.

Gorge jaune, écharpe noire en arrière de la gorge étroite. Aile 5 pouces et 4 à 9 lignes. Queue 3 pouces et 1 à 4 lignes; pennes mitoyennes 4 pouces 4 lignes. Bec 15 à 16 lignes.

Observé dans l'Europe méridionale, l'Asie mineure et l'Afrique septentrionale.

Cabinet des Sciences p. 72. sous localité.

N^o 1. Adulte, (Hongrie) — 2. Mâle adulte, tué près de Gurieff, bouches de l'Oural, acquis en 1861. — 3 et 4. Mâle et femelle adultes, tués en Mai 1862, près de Sarepta, Wolga inférieure. — 5. Mâle adulte, Asie mineure, acquis en 1862. — 6. Adulte, Égypte, acquis en 1862.

MEROPS ORNATUS, Latham. — Merops melanurus, Lewin.

Rappelle en général le Merops apiaster; mais sa taille est moins forte, la gorge est d'un jaune plus foncé et offre une écharpe beaucoup plus large, le brun rouge de la tête et de la nuque est remplacé par un vert jaune tirant plus ou moins

au roux, le vert en général tire fortement au jaune, tandis que les scapulaires passent au bleu blanchâtre. Aile 3 pouces 11 lignes à 4 pouces 4 lignes. Queue 2 pouces et 8 à 11 lignes; pennes mitoyennes 4 pouces 10 lignes. Bec 15 à 18 lignes.

Observé dans l'Australie, à Timor, Lombok, Sumbawa, à la Nouvelle Guinée, à Halmahera et dans les îles avoisinantes.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, Australie, voyage de Mr. Gould. — 3. Adulte, Australie, 1860. — 4. Individu dans la livrée de passage, Australie, 1862. — 5. Mâle adulte, tué le 5 Août 1829, Timor, voyage du Dr. S. Müller. — 6. Mâle adulte, tué, en Juillet 1829, Timor, S. Müller. — 7. Jeune femelle, tuée le 16 Juillet 1829, Timor, S. Müller. — 8. Femelle, livrée pas tout à fait parfaite, Bima à Sumbawa, voyage du Dr. Forsten. — 9. Mâle adulte, Lombok, voyage de Mr. Wallace, 1858. — 10. Mâle, livrée imparfaite, Havre Dorey, Nouvelle Guinée, voyage de Mr. Wallace, 1859. — 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Femelles, toutes à queue pourvue des pennes mitoyennes allongées et à teintes plus ou moins semblables à celles de la livrée parfaite, mais moins pures; tuées en Avril 1861, Ternate, voyage du Dr. Bernstein. — 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Mâles; tous dépourvus des pennes allongées de la queue et au premier plumage; l'écharpe noire de la gorge ne commençant à se montrer que dans le N°. 17; tués en Avril 1861, Ternate, Bernstein. — 24. Femelle, livrée parfaite, tuée le 24 Avril 1862, Dodingo à Halmahera, Bernstein. — 25 et 26. Femelles, livrée parfaite; tuées en Juillet, Galéla à Halmahera, Bernstein. — 27. Mâle, livrée à peu près parfaite, tué le 25 Mai 1862, Dodingo, Halmahera, Bernstein. — 28. Femelle, premier plumage, tuée le 6 Juillet 1861, Galéla, Halmahera, Bernstein.

29. Crâne, Novembre 1828, Timor, S. Müller.

MEROPS ALBICOLLIS, Vieillot. — *Merops Cuvieri*, Lichtenst. Très reconnaissable à sa gorge, son front et ses sourcils d'un blanc tirant un peu au jaune. Pennes mitoyennes de la queue

assez allongées. Aile 3 pouces 3 lignes à 4 pouces. Queue 2 pouces 6 lignes à 3 pouces; pennes moyennes 7 pouc. 8 lign. Bec 11 à 14 lignes. — Iris de l'oeil rouge (Pel).

Observé au Sennaar et Kordofan, et dans l'Afrique orientale depuis la Sénégambie jusqu'à Angola.

1. Mâle adulte, Abyssinie. — 2 et 3. Adultes, Kordofan, présentés par Mr. Clot-Bey. — 4 et 5. Adultes, Sénégal. — 6. Adulte, Sénégal, 1862. — 7. Adulte, tué le 28 Avril 1841, Saccondé, Côte d'or, voyage de Mr. Pel. — 8, 9, 10 et 11. Adultes, Côte d'or, présentés par Mr. le Colonel Nagtglas, 1861. — 12, 13, 14 et 15. Individus dans la livrée à-peu-près parfaite, mais à pennes moyennes de la queue plus ou moins imparfaitement développées, Côte d'or, 1861.

MEROPS VIRIDIS, Linné. — Merops Lamarckii, G. Cuvier.

Teinte dominante d'un vert jaune, tirant sur le roux à la nuque. Gorge d'un bleu verdâtre clair et terminé par une écharpe noire étroite. Aile 3 pouces 6 lignes. Queue 2 pouces à 2 pouces 6 lignes; pennes moyennes 4 pouces 7 lignes. Bec 12 lignes.

Observé dans l'Hindoustan et à Ceylan.

1. Adulte, (Decan.) — 2 et 3. Adultes, Colombo, Ceylan, voyage de Mr. Diard, 1859.

MEROPS VIRIDISSIMUS, Swainson. — Merops viridis, Rüppell, sed non Linné. — Merops aegyptius, Kittlitz (nec Forsk.), Kupfertafeln, pl. 7, fig. 1.

Assez semblable au Merops viridis; mais aux teintes vertes tirant fortement sur le jaune, même à la gorge, et à taille tant soit peu moins forte, tandis que les pennes moyennes de la queue sont plus longues. Aile 3 pouces et 3 à 5 lignes. Queue 2 pouces et 3 à 6 lignes; pennes moyennes 5 pouces 8 lignes. Bec 9 à 12 lignes.

Observé dans la Sénégambie, et dans le Sennaar jusqu'en Égypte.

1. Mâle adulte, Sénégal. — 2. Femelle, à-peu-près dans la livrée parfaite, Sénégal. — 3. Mâle adulte, Nubie, voyage du Dr. Rüppell. — 4. Adulte, Sennaar, présenté par Mr. Ruysenaers. — 5. Individu à-peu-près adulte, Sennaar, Ruysenaers. — 6. Adulte, Égypte. — 7 et 8. Individus dans la livrée à-peu-près parfaite, Égypte, prés. par Mr. Clot-Bey. — 9. Individu dans la livrée de passage, Égypte, présenté par Mr. Clot-Bey. — 10. Jeune ind., même origine que le N^o. 9.

C. Teinte dominante rouge.

MEROPS NUBICUS, Gmelin. — *Merops coeruleocephalus*, Lath.

Tête avec la gorge, croupion, couvertures de la queue et bas-ventre couleur terre verte. Aile 5 pouces et 9 à 10 lignes. Queue 3 pouces et 8 à 10 lignes; pennes moyennes 6 pouces 10 lignes. Bec 16 lignes.

Observé dans la Sénégambie. Commun sur les bords du Nil blanc et du Nil bleu, où il niche (Heuglin). Visite en hiver le Kordofan, le Sennaar et l'Abyssinie (Rüppell).

1. Cabinet Temminck 1807 (N^o 243 Cabinet Temminck 1807. N^o 1, 2 et 3. Adultes, (Sénégal). — 4. Mâle adulte, tué en Février 1862, Abyssinie, voyage de Mr. de Heuglin.

nubicoides

MEROPS NATALENSIS, Reichenbach. — *Merops nubicoides*, Des Murs.

Très semblable au *Merops nubicus*, qu'il paraît remplacer dans la Cafrérie; mais à gorge teinte, au lieu de vert, d'un beau rouge de rose foncé. Aile 5 pouces et 3 à 10 lignes. Queue 3 pouces et 6 à 8 lignes; pennes moyennes 7 pouces 8 lignes. Bec 17 à 18 lignes.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, Cafrérie, voyage de Mr. J. Verreaux. — 3. Jeune, Cafrérie, Verreaux.

malimbicus

MEROPS BICOLOR, Daudin. — *Merops malimbicus*, Shaw.

Dessus d'un gris de schiste, tirant sur la queue au rouge-brun; dessous rouge de rose foncé; gorge bordée latéralement

de blanc. Aile 4 pouces 10 lignes à 5 pouces 5 lignes. Queue 2 pouces 9 lignes à 3 pouces.; penes mitoyennes 4 pouces 6 lignes. Bec 14 à 16 lignes.

Observé dans la Guinée.

1. Adulte; Gaboon, par Mr. Verreaux. — 2. Jeune, Gaboon, Verreaux. — 3 et 4. Adultes, Gaboon, voyage de Mr. du Chaillu, acquis en 1865.

D. Plumes de la gorge allongées.

1000 184.

MEROPS FORSTENI, Temminck, Mus. Nederl.; Meropogon Forstenii, Ch. L. Bonaparte; Consp., I, p. 164.

Plumes de la gorge et du jabot assez allongées, d'un bleu de cobalt foncé, qui se répand également sur les côtés et le dessus de la tête. Nuque d'un brun rouge noirâtre. Dos, ailes et penes mitoyennes de la queue d'un vert d'herbe; les autres penes caudales d'un roux rougeâtre foncé à bords externes noirâtres, mais la paire extérieure à barbe externe verte. Poitrine noirâtre. Vente noirâtre lavé de vert. Sous-caudales d'un roux rouge lavé de vert. Aile 4 pouces 3 lignes. Queue 3 pouces 10 lignes; penes mitoyennes 6 pouces. Bec 18 lignes. Pieds noirâtres.

1. Mâle, plumage parfait, tué à Tondano, Célèbes, voyage du Dr. Forsten: individu type.

2000 II. Queue carrée ou échanquée.

A. Teinte dominante verte; gorge sans écharpe. Queue carrée.

1840 1840

MEROPS BULLOCKI, Vieillot. — Merops cyanogaster, Swainson. — Merops frenatus, Hartlaub, Westaf., p. 42.

Dessus et ailes d'un vert tirant au jaune roussâtre, passant au roux sur la nuque et au roux-jaune sur la plus grande partie des penes caudales à l'exception des deux mitoyennes. Une raie noire à travers l'oeil, bordée de bleu-vert dans les très vieux individus. Gorge d'un beau rouge de rose foncé.

Bas-ventre et couvertures inférieures de la queue d'un bleu intense. Les autres parties inférieures d'un roux tirant au jaune verdâtre. Aile 3 pouces et 6 à 8 lignes. Queue 3 pouces à 5 pouces 2 lignes. Bec 11 à 14 lignes.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, Sénégal. — 3. Jeune, Sénégal. — 4. Adulte, Nil blanc, voyage de Mr. de Heuglin, 1861, sous le nom de *Merops frenatus*: aile 3 pouces 7 lignes.

Merops bullockoides, Smith 1834

MEROPS SMITHII — *Merops Bullockoides*, A. Smith.

Voisin du *Merops Bullocki*; mais d'une taille plus forte, à front et menton blancs et à croupion bleu. Aile 4 pouces 4 lignes. Queue 3 pouces 4 lignes. Bec 14 lignes.

Observé dans la Cafrérie.

1. Adulte; [Cafrérie. ^{West Africa, Senegal} — 2. Adulte, Gaboon, voyage de Mr. du Chaillu, acquis en 1865.

B. Gorge pourvue d'une écharpe foncée. Queue plus ou moins échancrée.

Merops quinticolor leschenaultii

MEROPS QUINTICOLOR (ad.) et *Leschenaultii* (juv.), Vieillot. — *Merops urica*, Horsfield.

Rappelle, en général, le *Merops apiaster* par la distribution de ses teintes; mais il a le front teint du même roux foncé que le dessus de la tête, la nuque et le manteau; la raie noire à travers l'œil n'est sensible que dans les jeunes individus; les scapulaires sont vertes, et le vert des parties inférieures tire fortement au jaune et passe même, vers la gorge, dans cette teinte. Aile 3 pouces et 7 à 9 lignes. Queue 2 pouces 9 lignes. Bec 15 lignes. Queue un peu échancrée.

Observé sur le Continent de l'Inde jusqu'au Nipaul, à Ceylan et à Java. — Espèce sédentaire que l'on rencontre, à Java, par paires, le long des ruisseaux, perchées sur quelque branche sans feuilles, d'où ces oiseaux s'élancent sur les termites, les aëschnes, d'autres libellules et généralement sur tous les insectes de l'ordre des Neuroptères qu'ils chassent

de préférence aux autres et qui offrent des proies abondantes et faciles à saisir dans les lieux où ces guépriers vivent (de Boscarmé, Notes manuscrites).

1 et 2. Mâles adultes, Java, voyage de Boié. — 3. Jeune individu, semblable à la figure du «Guéprier Laichenot» de Le Vaillant, Guépriers, pl. 18: taille plus petite que dans les adultes, une raie noirâtre à travers l'oeil, et l'écharpe de la gorge verdâtre; aile 3 pouces 6 lignes, queue 2 pouces 4 lignes, bec 8 lignes et demie; tué en Juillet 1826, Tapos à Java, voyage de Boié.

4. Squelette, Java, Boié.

Heut. Abrielle 1786

— **MEROPS ERYTHROPTERUS**, Gmelin. — *Merops variegatus*, Vieillot (ex parte); Guéprier Sonnini, Le Vaillant. — *Merops collaris* et *minutus*, Vieillot. — *Merops cyanipectus*, J. Verreaux (très vieux). — [Kittlitz, Kupfertafeln, VII, fig. 2. — *Mellitophagus erythropterus*, Fr. Boié. — *Merops variegatus*, Rüppell, Syst. Uebers., p. 24. — Reichenbach, tab. 447, fig. 5240 et 5241; tab. 446, b, fig. 3592 et 3295.

Aile 2 pouces 9 lignes à 3 pouces. Queue 2 pouces et 1 à 3 lignes. Bec 9 à 12 lignes. Queue un peu échancrée. Dessus d'un vert tirant au jaune, et passant, sur la ligne surciliaire, rarement et d'une manière peu sensible, au bleu clair. Une raie noire à travers l'oeil. Gorge et partie inférieure des joues jaune de citron. En arrière de la gorge, une large écharpe bleue ou noire et passant vers le devant au bleu. Elle est suivie d'une écharpe teinte de marron. Les autres parties inférieures d'un jaune roussâtre. Pennes de la queue rousses, à bords extérieurs verts, et munies d'une large bande terminale noire, bordée de blanchâtre. Les jeunes individus n'offrent pas de trace des écharpes du jabot et tout porte à croire que l'écharpe, d'abord noire, ne prend la teinte bleue que successivement et dans la livrée très parfaite.

Observé au Congo, Gaboon, à la Côte d'or, en Sénégambie. Visite, en hiver, l'Abyssinie (Rüppell, Heuglin).

N^o 1. Adulte, un des types du Guêpier à collier bleu ou Sonnini de Le Vaillant, Guêp., pl. 7; Malimbe, voyage de Perrin. — 2. Mâle, à-peu-près au plumage parfait, tué le 2 Mai 1841, Saccondé, Côte d'or, voyage de Pel. — 3 et 4. Individus semblables au N^o 2, Côte d'or, présentés par Mr. le Colonel Nagtglas, 1861. — 5. Individu à-peu-près au plumage parfait, Sénégal, par Mr. Moritz, 1862. — 6. Individu semblable au N^o 5, Sénégal. — 7. Jeune, Sénégal. — 8 et 9. Individus à-peu-près adultes, Abyssinie, présentés par Mr. Clot-Bey. — 10. Jeune individu, même origine que les N^o 8 et 9. — 11. Femelle adulte, tuée en Décembre 1861, Abyssinie, voyage de Mr. de Heuglin.

Mellitophagus Lafresnayi, Guérin 1843

MEROPS VARIEGATUS, Vieillot (ex parte); Kittlitz, Kupfer-
tafeln, VII, fig. 5. — *Mellitophagus variegatus*, G. R. Gray,
List, p. 71. — *Merops erythropterus*, Rüppell, Syst. Uebers.,
p. 24; Heuglin, Syst. Uebers., p. 19. — *Merops Lafresnayi*,
Guerin. — *Merops Lefeburii*, Des Murs. — Reichenbach, pl.
447, fig. 5258 et 5259.

Voisin du *Merops erythropterus*, mais d'une taille plus forte; front et une large raie surciliaire d'un beau bleu de cobalt; dessous, à partir de l'écharpe bleue du jabot, plus roux; teinte roussâtre des pennes caudales plus claire et tirant sur le jaune, et barre noire de la queue plus large. Aile 3 pouces 8 lignes. Queue 3 pouces. Bec 12 à 13 lignes.

Commun, pendant toute l'année, en Abyssinie, au Sennaar et Kordofan.

Abyssinie (anc. Sennaar)

1. Adulte, (Sennaar) voyage de Mr. Rüppell. — 2. Mâle adulte, tué en Juillet 1861, Kéren, Pays des Bogos, voyage de Mr. Th. von Heuglin. — 3. Mâle adulte, tué en Février 1862, Gondôl en Abyssinie, v. Heuglin.

Dicrrocercus

MEROPS HIRUNDINACEUS, Vieillot. (only N^o 2.)

Très reconnaissable à sa queue profondément fourchue. Aile 3 pouces 5 lignes. Queue: pennes internes 2 pouces et 4 à

6 lignes; pennes externes 3 pouces 8 lignes. Bec 15 lignes. Teintes rappelant en général celles du *Merops erythropterus*; mais l'écharpe du jabot étroite et d'un bleu clair; la poitrine verte; le bas-ventre et les couvertures caudales d'un bleu blanchâtre et les pennes de la queue vertes ou bleuâtres et terminées par une étroite bande noire bordée de blanc.

Observé dans la Sénégambie et dans l'Afrique australe.

1. Individu au plumage parfait, Sénégal. — 2. Individu à peu-près adulte (Sénégal. "Yitelcy") ¹⁸⁶² no localité

C. Plumes de la gorge allongées. Queue carrée.

MEROPS GULARIS, Shaw. — *Mellitophagus gularis*, G. R. Gray.

Très reconnaissable à sa teinte d'un noir, passant au roux sur les deux premiers tiers des rémiges, varié de bleu-vert blanchâtre au front, le long des sourcils, sur les parties inférieures et le croupion, et remplacé, sur la gorge, par un rouge ardent. Dans les jeunes, cependant, la gorge offre au lieu de rouge, les mêmes teintes que les autres parties inférieures. Aile 3 pouces et 3 à 5 lignes. Queue 2 pouces et 4 à 6 lignes. Bec 12 à 14 lignes.

Observé à Sierra Léone, à la Côte d'or et au Gabon.

1 et 2. Mâle et femelle adultes, tués en Février 1842, Dabo-crom, Côte d'or, voyage de Mr. Pel. — 3. Femelle adulte, Rio Boutry, Côte d'or, Pel. — 4, 5 et 6. Adultes, Côte d'or, présentés par Mr. le Colonel Nagtglas, 1861. — 7 et 8. Jeunes, tués en automne 1861, Côte d'or, présentés par Mr. le Colonel Nagtglas.

MEROPS ATHERTONI, Jardine et Selby. — *Nyctiornis Athertoni*, Hodgson. — *Bucia Athertonii*, Blyth.

Taille forte. Plumage d'un vert passant au bleuâtre sur le front et les longues plumes pendantes de la gorge, et remplacé, sur le dessous, à partir du jabot, par un jaune gris, relevé sur la poitrine par des mèches verdâtres. Aile 4 pouces

10 lignes à 5 pouces 2 lignes. Queue 4 pouces et 2 à 7 lignes.
Bec 18 lignes.

Observé au Nipaul, au Bengale et dans l'Afghanistan.

1 et 2. Mâles adultes, { Nipaul. *Nipaul, de Malacca, Timor*
Nyctiornis

MÉTROPES AMICTUS, Temminck, ¹⁸²⁴ Pl. col. 510. — *Nyctiornis*
amicta, Swainson.

Taille forte. Plumage vert d'herbe ; mais, dans les adultes, la base du bec bordée de bleu d'aigue-marin, le front d'une belle couleur de lilas rose, la gorge rouge vermillon clair, et les deux premiers tiers de la face inférieure des plumes caudales d'un jaune de cire. Au premier plumage, les belles teintes rouges de la tête et de la gorge sont remplacées par la même teinte verte qui occupe toutes les autres plumes de l'oiseau. Aile 4 pouces et 6 à 10 lignes. Queue 3 pouces et 1 à 3 lignes. Bec 17 à 20 lignes.

Observé à Ténasserim, Malacca, Sumatra, Bangka et Bornéo.

1. Mâle adulte, Pontianak à Bornéo, voyage de Mr. Diard. ¹⁸²⁶
2. Jeune mâle, Kapouas, Bornéo méridional, voyage de Schwanner. — [3. Mâle adulte, Sumatra, voyage du Dr. Müller. —]
- [4. Jeune mâle, Padang à Sumatra, S. Müller. — 5. Adulte : [la teinte rose du devant du front [remplacée par du rouge vermillon ; Bangka, présenté par Mr. J. F. R. S. van den Bossche.
6. Squelette, Pontianak à Bornéo, Diard. — 7. Squelette, Padang, S. Müller. — 8. Squelette, Indrapoura, S. Müller.

R É S U M É.

		Indiv. montés	Squelettes.	Crânes.
Merops	<i>aegyptius. superciliosus</i> P. ¹	2.	11	1
"	<i>philippinus.</i>	" 2.	12	4
"	<i>badius. sumatranus</i>	" 3.	9	1
"	<i>apiaster.</i>	" 4.	6	
"	<i>ornatus.</i>	" 4.	28	1
"	<i>albicollis.</i>	" 5.	15	
"	<i>viridis.</i>	" 6.	3	
"	<i>viridissimus.</i>	" 6.	10	
"	<i>nubicus.</i>	" 7.	4	
"	<i>natalensis.</i>	" 7.	3	
"	<i>bicolor.</i>	" 7.	4	
"	<i>Forsteni.</i>	" 8.	1	
"	<i>Bullockii.</i>	" 8.	4	
"	<i>Smithii.</i>	" 9.	2	
"	<i>quinticolor.</i>	" 9.	3	1
"	<i>erythropterus.</i>	" 10.	11	
"	<i>variegatus.</i>	" 11.	3	
"	<i>hirundinaceus.</i>	" 11.	2	
"	<i>gularis.</i>	" 12.	8	
"	<i>Athertoni.</i>	" 12.	2	
"	<i>amictus.</i>	" 13.	5	3
			<hr/>	<hr/>
		146	10	2

Total 158 échantillons.