

NOTE IX.

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE PÉDICULINE.

PAR

E. PIAGET.

(Plate 2, fig. 2).

Laemobothrium setigerum, nov. spec.

La tête conique, tronquée, émarginée en avant et pourvue de soies aplaties, moins nombreuses chez le mâle et qui caractérisent cette espèce (fig. *a* grossie); les antennes courtes, entièrement cachées sous la protubérance latérale, le 3^e article étranglé, le 4^e arrondi avec de fins poils sensoriaux (fig. *c*); les yeux doubles avec un fin poil; les tempes un peu aiguës en arrière, avec quelques longues soies et une rangée de poils en arrière de l'oeil; l'occiput rentrant et saillant au milieu avec une bande en avant presque parallèle au bord; deux bandes un peu convergentes en arrière, allant de l'occiput à l'extrémité antérieure et se bifurquant pour contourner la tempe; les mandibules relativement petites et très aiguës, avec une fine bande ondulée en avant et une autre transverse, semicirculaire en arrière; les palpes courtes et épaisses, 4-articulées, avec un mamelon à la base (fig. *b* grossie), le 4^e article le plus long et légèrement coloré.

Le thorax composé de deux segments: le prothorax élargi vers le milieu, avec quelques soies et une bande qui contourne l'avant et s'arrête après le milieu; au prosternum une tache médiane et deux bandes en S qui bordent la base des hanches antérieures; le métathorax en cloche, avec un sillon médian incolore et en dessous des bandes qui entourent les hanches; le bord postérieur est rentrant. Les pattes longues et robustes; les fémurs avec une tache dorsale et terminale et une série de soies implantées sur des pustules incolores; les tibias recourbés à la base, clavifor-

Notes from the Leyden Museum, Vol. XI.

mes et obliquement tronqués à l'extrémité, avec une série de poils au bord interne et quelques soies externes; les tibias antérieurs sont pourvus d'une touffe de poils à l'extrémité; les tarsi longs et claviformes, avec deux ongles recourbés à la pointe; les palettes larges, triangulaires, la supérieure plus colorée que l'inférieure.


L'abdomen elliptique très-allongé, composé de 10 segments d'inégale longueur, les moyens les plus longs, tous avec un sillon longitudinal non-interrompu; les bandes latérales élargies aux deux extrémités; les angles des segments ne font pas saillie et portent une forte soie à partir du 6^e; les segments, colorés surtout aux bords jusqu'à peu de distance de la suture antérieure, offrent une série de pustules sétigères dont les 2 moyennes sont plus spatieuses que les autres; les bords de l'abdomen sont armés en dessus de poils épineux un peu aplatis, sauf le 9^e dont les poils sont fins, le dernier segment court, un peu tronqué (♀), bordé de longues soies. A la face ventrale la vulve est bilobée, bordée de courts poils, avec une rangée de courtes soies. Chez le mâle, dont toutes les dimensions sont moindres, le dernier segment est arrondi, les appendices externes du pénis robustes, renflés au milieu, recourbés en crochet à l'extrémité et flanqués d'une légère protubérance garnie de soies serrées dirigées vers le milieu (fig. d).

La teinte générale est châtain-foncé, les bandes noirâtres.

Dimensions: long. totale: ♀ 0,084, ♂ 0,072

longueur:	♀	♂	largeur:	♀	♂
tête	0,015	— 0,015	0,012	— 0,011
thorax	0,0162	— 0,013	0,012	— 0,010
abdomen	0,053	— 0,043	0,016	— 0,0135
3 ^e fémur	0,017	— 0,014	0,005	— 0,0045
3 ^e tibia	0,011	— 0,010	0,0035	— 0,003
3 ^e tarse	0,005	— 0,004			
antenne	0,0015				
palpes	0,0022				

Sur une *Ibis Cayennensis*. Les exemplaires de cette curieuse espèce ont été recueillis par M. le Dr. H. ten Kate.



Dr. R. Horst & Dr. E. Piaget ad nat. del.

A. J. J. Wendell lith.

P. W. M. Trap impr.

2. *Laemobothrium setigerum* Piaget.