

## NOTE X.

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DE  
BUPRESTIDE DE L'AFRIQUE.

PAR

J. W. van LANSBERGE.

*Psiloptera monoglypta*, spec. nov.

*Modice elongata, obscure aenea, subtus indumento griseo tecta, elytris thoracisque plagis cupreo marginatis; thorace callis sex ornato, quorum duobus mediis maximis, sulco longitudinali sat profundo; elytris interstitiis alternis foveolatis; abdomine utrinque callorum serie instructo.* — Long. 20—32, lat. 8—12 mm.

De forme elliptique allongée, assez large entre les épaules, les élytres terminées en ogive, d'un bronzé obscur passant au cuivreux dans toutes les impressions, avec un bord corrodé rouge cuivreux autour des élytres, les tarse bleuâtres, le dessous couvert de poils gris mêlés à un enduit gris-rougeâtre, qu'on trouvera probablement aussi sur les impressions de dessus dans les exemplaires frais. Tête couverte de rugosités allongées, les yeux très grands. Prothorax couvert d'une ponctuation irrégulière, assez fortement sillonné, un peu impressionné transversalement avant la base qui a un petit rebord formant triangle en face de l'écusson; près des angles antérieurs de chaque côté une callosité arrondie au dessous de laquelle se trouve une seconde callosité allongée, se dirigeant obliquement vers le centre; sur le disque deux très grandes callosités ovalaires, ces différentes callosités reliées parfois par d'autres plus petites. Elytres à stries régulières, les intervalles plans, plus ou

moins régulièrement ponctués, parfois ridés, les impairs ornés d'une rangée de fovéoles arrondies, le troisième le plus lisse, n'ayant guère de ponctuation en dehors des fovéoles, les épaules saillantes, le bord bisinué en dessous de l'épaule. Sternum orné de plaques lisses, le prosternum légèrement bituberculé en avant. Abdomen orné au milieu de rugosités lisses, les 2<sup>me</sup>, 3<sup>me</sup> et 4<sup>me</sup> segments ayant de chaque côté une callosité lisse, ovulaire, assez grande.

Cette espèce, originaire de la Caffrerie orientale (coll. de l'auteur) et d'Ovumbo (Musée de Leyde), est voisine du *P. 4-oculata* Boh., qui a à peu près les mêmes callosités prothoraciques, mais dont le prothorax est moins élargi en avant, à peine sillonné, et qui a les stries des élytres plus larges, dorées dans le fond, et les intervalles sans fovéoles. Elle appartient à la division indiquée par Mr. Thomson sous le nom de *Damarsila*.