

NOTE VI.

DEUX ESPÈCES NOUVELLES DU GENRE
HETERO CERUS

PAR

A. GROUVELLE.

Heterocerus (Litorimus) infuscatus, n. sp.

Oblongus, modice convexus, nitidulus, niger, rufo fulvoque variegatus. Antennae extra primum et secundum articulum infuscaetae. Caput transversum, fronte convexiusculum, antice subtruncatum, pube flavo-cinerea, tenui, subdense vestitum; labro magno, antice truncato, utrinque rotundato. Prothorax infuscatus, ad angulos anticos et in disci medio rufescens, transversissimus, angulis anticis subrotundatus, lateribus arcuatus, antice angustus, basi medio subarcuatus, utrinque oblique subtruncatus et tenuiter marginatus, dense punctulatus, pube brevi, grisea, subdense vestitus, antice et ad latera pilis plus minusve elongatis instructus. Elytra humeris breviter rotundata, parallela, apice conjunctim subrotundata, paulo magis 1 et $\frac{1}{2}$ tam elongata quam simul lata, substriata, basi marginata, pube pruinosa, flava vestita, pilis paulo longioribus praecipue ad latera et ad apicem intermixtis, nigro-brunnea; singulo flavo-ferrugineo quadrinotato: 1^a et 2^a macula circiter ad primum longitudinis trientem, 3^a transversa, arcuata ultra medium, 4^a laterali, stricta, paulo ante apicem, extremitatibus valde lobato-producta. — Long. 3,7 mill.

Oblong, environ deux fois et demie plus long que large, modérément convexe, peu brillant, brun noirâtre, taché de testacé ferrugineux. Antennes enfumées, premier et deuxième article testacés. Tête un peu plus large que longue en tenant compte des mandibules, légèrement convexe sur le front, très densément pointillée, plutôt noire, couverte d'une pubescence flave cendrée, fine, presque dense; bord antérieur subtronqué, arrondi de chaque côté; labre subrectangulaire, plus de deux fois plus large que long; yeux modérément

saillants, à petites facettes. Prothorax un peu plus de deux fois et demie plus large dans sa plus grande largeur que long, noir brunâtre, marqué d'une tache rougeâtre vers les angles antérieurs et sur le disque d'une bande longitudinale, mal définie, de même couleur; bord antérieur très faiblement arqué, à peine subsinué vers les extrémités, bordé de chaque côté par une impression sulciforme, s'écartant progressivement et très faiblement, garni d'une frange de poils cendrés très peu marquée; angles antérieurs obtus, lorsque l'insecte est vu de dessus; bords latéraux arqués, divergents vers l'arrière, finement rebordés à la base; base faiblement arrondie au milieu, plus fortement aux extrémités, finement rebordée; angles postérieurs obtus, émoussés; ponctuation très fine et très dense; pubescence courte, serrée, cendrée, entremêlée sur le bord antérieur et sur les bords latéraux de poils plus ou moins longs, dressés. Écusson noirâtre. Elytres arrondis aux épaules, subparallèles, étroitement arrondis ensemble au sommet, un peu plus d'une fois et demie plus longs que larges ensemble, faiblement striés, densément pointillés, couverts d'une pubescence pruinée, flave, subdorée, entremêlée de poils inclinés peu allongés, gris-flaves; chacun d'eux marqué de quatre taches testacées-orangées: les deux premières petites, un peu allongées, sur une ligne un peu inclinée par rapport à la base, vers le premier tiers de la longueur, la troisième un peu au delà du milieu, transversale, arquée surtout au côté interne, s'étendant entre la 2^{me} strie discoïdale et la 6^{me}; la quatrième latérale, assez étroite, s'étendant presque au niveau de la 3^{me}, n'atteignant pas le sommet, prolongée en arrière en un lobe transversal, dilaté à l'extrémité, atteignant le disque de l'élytre, en avant en un lobe un peu élargi, s'étendant parallèlement à la suture; base des élytres bordée par un faible bourrelet. Dessous noirâtre, couvert d'une pubescence grise, couchée, assez longue et assez dense. Labre du mâle environ deux fois plus large que long; mandibules largement anguleuses à la base.

Hab. Yunnan (R. P. Ducloux). — Collections A. Grouvelle et du Musée de Leide.

Cette description a été faite sur des exemplaires à coloration noire complètement développée. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, l'insecte prend une teinte générale brune, plus ou moins claire, suivant l'état de développement; la région basilaire et l'épaule ont une teinte plus claire que celle du fond qui tend à se réunir à la tache postérieure externe; la tache postérieure interne rejoint la suture, se prolonge contre elle et vient se souder au lobe postérieur de la quatrième tache.

Heterocerus Sauteri, n. sp.

Oblongus, modice convexus, subopacus, nigro-brunneus, subrufo-testaceo-variegatus. Antennae testaceae, apice vix infuscatae. Caput transversum, fronte convexiusculum, rufo-infuscatum, pube flavo-grisea, brevissima, densissime vestitum; margine antico medio sinuato, ad extremitates rotundato; labro magno, apice latissime rotundato. Prothorax transversissimus, angulis anticis rotundatus, lateribus arcuatus, antice angustus, basi praecipue ad extremitates arcuatus, disco infuscatus, lateribus late fulvo-testaceo marginatus, crebre punctulatus, pube flavo-cinerea, brevissima, dense vestitus, antice et ad latera pilis plus minusve elongatis instructus. Elytra humeris breviter rotundata, parallela, apice conjunctim subacuminata, 1 et $\frac{1}{2}$ tam elongata quam simul lata, basi marginata, pilis brevissimis, flavis, creberrimis vestita, dense punctulata, fulvo-testacea, macula nigricanti communi, magna ornata; macula suturae apicem attingente, acutissima, usque humeros extendente, utrinque bilobata. Stria marginalis coxarum intermediarum haud inflexa. — Long. 4,2 mill.

Oblong, environ deux fois et demie plus long que large, modérément convexe, peu brillant, noirâtre, varié de testacé. Antennes testacées, légèrement enfumées à l'extrémité, de 10 articles. Tête un peu plus large que longue en tenant compte des mandibules, légèrement convexe sur le front, très densément pointillée, roux-enfumé, couverte d'une pubescence jaune grisâtre, très courte et très serrée; bord antérieur largement subtronqué, subsinué au milieu, arrondi

aux angles; labre subdemicirculaire; yeux assez saillants, à facettes modérément petites. Prothorax environ deux fois et demie plus large dans sa plus grande largeur que long, noirâtre, largement bordé de fauve-testacé sur les côtés; bord antérieur très faiblement arrondi, bordé de chaque côté aux extrémités par une strie un peu sulciforme, garni d'une frange de très petits poils blanchâtres; angles antérieurs arrondis lorsque l'insecte est vu de dessus; bords latéraux arqués, divergents vers l'arrière, à peine visiblement rebordés; base faiblement arrondie au milieu, plus fortement aux extrémités, finement rebordée; angles postérieurs obtus, à peine émoussés; ponctuation très fine et très dense; pubescence très courte, très serrée, flave-cendrée, complétée sur le bord antérieur et sur le bord latéral par des poils plus ou moins longs, dressés. Ecusson noirâtre. Elytres étroitement arrondis aux épaules, subparallèles, faiblement acuminés ensemble au sommet, un peu plus d'une fois et demie plus longs que larges ensemble, testacés, avec une grande tache noirâtre commune, laissant à la base, vers les épaules, une étroite bordure claire, atteignant presque le bord latéral, d'abord brièvement subparallèle, puis échancrée en demi ovale, redevenant droite, mais s'écartant progressivement un peu plus du bord latéral, échancrée profondément vers le milieu en forme de dent arquée en arrière, puis formant un lobe saillant, subarrondi et terminée en pointe très aiguë au sommet de la suture; base bordée par un faible bourrelet; ponctuation très fine, très serrée, entremêlée de points un peu moins fins, espacés; pubescence flave, serrée, très courte, un peu plus longue sur les marges latérales. Dessous testacé, faiblement pubescent. Strie marginale des hanches intermédiaires non recourbée en arrière. Labre du mâle plus allongé, presque aussi long que large; mandibules élargies à la base en lobe subanguleux, allongé, modérément saillant.

Hab. Formose: Anping et Kosempo (H. Sauter). — Collections du Musée de Leide et A. Grouvelle.

Paris, Novembre 1910.