

NOTE VI.

DESCRIPTIONS DE DRYOPIDES (PARNIDES) ET
HELMIDES NOUVEAUX

PAR

A. GROUVELLE.

Pelonomus insularis, n. sp.

Elongatus, oblongus, convexus, fusco-olivaceus, pube grisea sat dense vestitus; prothorace dense fortiterque punctato, margine basilari utrinque late impresso, impressione extus breviter substriata; elytris fortiter punctato-striatis. — Long. 6 mill.

Allongé, oblong, convexe, brun olivâtre, couvert d'une pubescence formée de poils squamiformes cendrés et de longs poils plus foncés. Front longitudinalement subcaréné. Prothorax sensiblement moins long que large, densément et fortement ponctué, longitudinalement caréné; marge basilaire déprimée, impressionnée surtout dans la partie voisine des angles postérieurs, substriée aux extrémités de cette dépression. Écusson finement rugueux, cordiforme. Elytres environ deux fois et demie aussi longs que larges ensemble, fortement ponctués-striés jusqu'à l'extrémité; intervalles finement et assez densément ponctués.

Hab. St. Domingue, collection Fry; Haiti, collection R. Oberthür.

Parygrus elateroides, n. sp.

Elongatus, parallelus, convexus, fusco-olivaceus, pube

Notes from the Leyden Museum, Vol. XVIII.

flavo-grisea sat dense vestitus; prothorace transverso, parce punctato; elytris triplo longioribus quam latioribus, sat fortiter punctato-striatis, striis ad apicem minus impressis. — Long. 5 mill.

Allongé, parallèle, convexe, brun olivâtre, couvert d'une pubescence formée de poils courts, squamiformes, pas très serrés, fauves, entremêlés de poils plus longs de nuance plus cendrée. Prothorax sensiblement plus large que long, rétréci en avant, à peine à la base, présentant vers le milieu sa plus grande largeur, très éparsement ponctué; bords latéraux relevés en un fin bourrelet. Ecusson ovale, acuminé au sommet. Elytres plus larges que le prothorax, parallèles, environ trois fois plus longs que larges ensemble, assez fortement ponctués-striés; stries ponctués atténués vers le sommet. Tibias et tarses rougeâtres.

Hab. Brésil: Province de Pernambuco (Pery-Pery). — Collection Gounelle.

Nous rapportons à la même espèce un exemplaire de taille plus grande et de forme un peu plus trapue, provenant de S. Paul (Brésil). — Collection Fry.

Dryops aquinozialis, n. sp.

Elongato-oblongus, convexus, fusco-olivaceus, subaureosericeus, griseo-pilosus; elytris magis fortiter quam prothorace punctatis, punctis ad apicem minoribus; antennis pedibusque fuscis, tarsis dilutioribus. — Long. 4 $\frac{1}{2}$ mill.

Allongé, ovale, convexe, olivâtre, couvert d'une pubescence formée de poils fauves, à peine dorés, très courts, assez serrés, entremêlés de longs poils gris cendrés. Prothorax environ deux fois aussi large à la base que long, rétréci en avant, subparallèle à la base, un peu éparsement et assez finement ponctué; carènes latérales subparallèles dans la moitié basilaire. Elytres plus de deux fois plus longs que larges ensemble, un peu plus larges que le prothorax, beaucoup plus fortement ponctués que lui,

sans vestiges de sillons. Antennes et pattes d'un brun de poix, tarses rougeâtres.

Hab. Nelle Grenade: Rio Magdalena (Dr. O. Thieme). — Collection R. Oberthür.

Dryops Germaini, n. sp.

Elongato-ovatus, *fusco-olivaceus*, *aureo-sericeus*, *fusco-pubescentis*; *capite prothoraceque sat dense punctatis*, *angulis posticis prothoracis acutis*; *elytris prothorace fortius punctatis*; *antennis femoribusque piceis*, *tibiis tarsisque rufescentibus*. — Long. 5 mill.

Ovale, allongé, convexe, brun olivâtre, couvert d'une pubescence formée de petits poils dorés, très courts et assez serrés, entremêlés de poils foncés assez longs. Prothorax environ deux fois plus large à la base que long, rétréci au sommet; bords latéraux faiblement bisinués, angles postérieurs aigus, carènes latérales parallèles dans les deux tiers basilaires, ponctuation pas très dense, assez forte et profonde. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble, beaucoup plus fortement ponctués que le prothorax, sans vestiges de stries. Antennes et fémurs bruns; tibias et tarses rougeâtres.

Hab. Bolivie: Province de Cochabamba, recolté par P. Germain. — Collection Grouvelle.

Dryops ovatus Grouv.

Ovatus, *convexus*, *fusco-olivaceus*, *aureo-sericeus*, *cinereo-pubescentis*, *dense punctulatus*; *angulis posticis prothoracis subrectis*, *elytris haud striatis*; *antennis pedibusque piceis*, *tarsis dilutionibus*. — Long. 6 à 7 mill.

Parnus ovatus Grouv. 1890, Bull. Soc. ent. de France, p. CXLVI.

Ovale, convexe, olivâtre, densément et finement ponctué, couvert d'une pubescence formée de petits poils dorés, très

courts et peu serrés, entremêlés de poils cendrés plus longs, mais ne donnant pas au tégument un aspect poilu. Prothorax environ deux fois et demie aussi large à la base que long, rétréci au sommet; bords latéraux régulièrement arqués, angles postérieurs droits, carènes latérales peu marquées, subparallèles sur presque toute la longueur. Elytres ovales, à peine plus larges à la base que le prothorax, environ deux fois aussi longs que larges dans la plus grande largeur, sans traces de sillons. Pattes et antennes d'un brun de poix, tarsi plus claires.

Hab. Brésil: Province de Rio de Janeiro. — Collection Grouvelle.

Dryops sobrinus, n. sp.

Elongatus, oblongus, convexus, fusco-olivaceus, aureosericeus, griseo-pubescens; prothorace parce punctato, antice angustato, angulis posticis subrectis; elytris prothorace fortius punctatis, obsoletissime sulcatis; antennis fuscis, pedibus rufis. — Long. 4 mill.

Allongé, oblong, convexe, brun olivâtre, couvert d'une pubescence formée de petits poils dorés, très courts, assez serrés, entremêlés de poils cendrés, plus longs. Prothorax peu densément et assez finement ponctué, un peu moins de deux fois aussi large à la base que long, rétréci au sommet; carènes latérales droites dans la moitié basilaire. Elytres un peu plus larges à la base que le prothorax, environ deux fois et demie aussi longs que larges ensemble, assez finement, mais plus fortement ponctués que le prothorax, très obsolètement subsillonnés à la base, auprès de l'écusson. Antennes brunâtres, pattes rougeâtres.

Hab. Brésil: Provinces de Bahia et de Pernambuco. — Collection Gounelle.

Dryops sublævis, n. sp.

Elongato-oblongus, convexus, nigro-olivaceus, dense punc-

Notes from the Leyden Museum, Vol. XVIII.

tatus, aureo-sericeus, griseo-pilosus; antennis pedibusque fuscis, tarsis rufis. — Long. $6\frac{1}{2}$ mill.

Allongé, oblong, convexe, noir olivâtre, densément ponctué, couvert d'une pubescence formée de squamules dorées courtes, peu serrées, entremêlées de poils gris pas très longs. Prothorax un peu plus de moitié aussi long que large à la base; stries latérales droites et parallèles sur les deux premiers tiers de leur longueur. Elytres un peu plus larges à la base que le prothorax, environ trois fois aussi longs que larges ensemble, non striés. Pattes et antennes foncées, tarsi rougeâtres.

Hab. Brésil: Province de Pernambuco. — Collection Gounelle.

Dryops hirtus, n. sp.

Elongato-oblongus, convexus, fuscus, aureo-sericeus, flavo-pilosus, sat profunde punctatus; angulis posticis prothoracis rectis; elytris haud sulcatis; antennis pedibusque fuscis, tarsis dilutioribus. — Long. $3\frac{1}{2}$ à 4 mill.

Allongé, oblong, convexe, brun foncé, parfois un peu rougeâtre lorsque la coloration n'est pas bien développée, couvert d'une pubescence formée de petits poils dorés, très courts, peu serrés, entremêlés de longs poils fauves. Prothorax environ deux fois aussi large à la base que long, peu densément ponctué; angles postérieurs droits, côtés arrondis, carènes latérales subparallèles dans la moitié basilaire, bien marquées. Elytres un peu plus larges à la base que le prothorax, environ deux fois et demie aussi longs que larges ensemble, beaucoup plus fortement ponctués que le prothorax, sans traces de sillons. Pattes et antennes brunes, tarsi plus claires.

Hab. Brésil: Province de Rio de Janeiro. — Collection Grouvelle.

Dryops cribratus, n. sp.

Elongato-oblongus, convexus, nigro-olivaceus, aureo-sericeus, fusco-pubescens; capite prothoraceque parce profun-

deque, elytris sat dense fortiterque punctatis; pedibus antennisque fuscis. — Long. 7 mill.

Allongé, oblong, convexe, noir olivâtre, couvert d'une pubescence formée de squamules courtes, dorées, peu serrées, entremêlées de longs poils foncés. Prothorax un peu plus de moitié aussi long que large à la base, peu densément, mais assez profondément ponctué; carènes latérales légèrement arquées en dedans dans les deux tiers basilaires. Elytres un peu plus larges que le prothorax, environ deux fois et demie aussi longs que larges ensemble, assez densément ponctués de gros points enfoncés peu réguliers, disposés en lignes très peu régulières surtout sur le disque et entremêlés de points plus petits. Pattes et antennes rembrunies.

Hab. Brésil. — Collection Grouvelle.

Dryops vicinus, n. sp.

Elongato-ovatus, convexus, fusco-olivaceus, aureo-sericeus, breviter flavo-pilosus, dense punctatus; angulis posticis prothoracis acutis; elytris haud striatis; antennis pedibusque fuscis, tarsis dilutioribus. — Long. 6 mill.

Allongé, ovale, convexe, olivâtre, couvert d'une pubescence formée de petits poils dorés, très courts, assez serrés, entremêlés de poils fauves, plus longs, mais de médiocre longueur. Ponctuation très dense, mais relativement fine. Prothorax environ deux fois aussi large à la base que long, régulièrement rétréci de la base au sommet; angles postérieurs aigus, carènes latérales peu marquées, subparallèles à la base. Elytres ovales, un peu plus larges que le prothorax à la base, environ deux fois aussi longs que larges ensemble, sans vestiges de sillons. Antennes et pattes d'un brun de poix, tarses plus claires.

Hab. Brésil: Province de Rio de Janeiro. — Collection Grouvelle.

Dryops similis, n. sp.

Elongato-ovatus, convexus, brunneo-olivaceus, aureo-sericeus,

flavo-pubescentis; capite prothoraceque dense punctatis; angulis posticis prothoracis acutis; elytris modice sed fortius quam prothorace punctatis, haud sulcatis; antennis pedibusque fuscis, tarsis dilutioribus. — Long. 4 mill.

Ovale, allongé, convexe, brun olivâtre, couvert d'une pubescence formée de petits poils dorés, très courts, assez serrés, entremêlés de poils fauves cendrés, assez longs. Prothorax plus de deux fois plus large à la base que long, rétréci régulièrement de la base au sommet, finement ponctué, angles postérieurs aigus; carènes latérales rectilignes, mais convergentes dans les deux tiers basilaires. Elytres deux fois et demie aussi longs que larges ensemble, un peu plus larges à la base que le prothorax, finement mais un peu plus fortement ponctués que le prothorax, sans traces de sillons. Antennes et pattes rembrunies, tarses plus claires.

Hab. Brésil: Provinces de Bahia et Minas Geraez. — Collection Grouvelle.

Dryops Gounellei, n. sp.

Elongato-oblongus, convexus, nigro-olivaceus; aureo-sericeus, cinereo-pubescentis; capite prothoraceque sat dense profundeque punctatis; elytris prothorace fortius punctatis, basin versus subsulcatis; antennis pedibusque piceis, tarsis dilutioribus. — Long. 5 $\frac{1}{2}$ mill.

Allongé, oblong, convexe, noir olivâtre, couvert d'une pubescence formée de squamules courtes dorées, assez serrées, entremêlées de longs poils cendrés. Prothorax presque deux fois aussi large à la base que long, rétréci au sommet, assez densément, mais moins fortement ponctué que la tête et les élytres; carènes latérales presque droites sur les quatre cinquièmes de leur longueur. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble, s'atténuant vers le sommet, couverts d'une ponctuation assez forte et assez

dense, obsolètement sillonnés à la base. Antennes et pattes d'un brun de poix, tarsi plus claires.

Hab. Brésil: Minas Geraez. — Collection Gounelle.

Dryops crassus, n. sp.

Elongato-oblongus, convexus, fuscus, flavo-sericeus, flavo-griseus-pubescentis; prothorace elytrisque dense punctatis, illis basin versus subsulcatis; antennis pedibusque rufis. — Long. $5\frac{1}{3}$ mill.

Allongé, oblong, convexe, brun olivâtre médiocrement foncé, couvert d'une pubescence formée de petits poils très courts, assez serrés, fauves à peine dorés, entremêlés de longs poils gris fauves. Prothorax plus de deux fois plus large à la base que long, rétréci au sommet, presque rétréci à la base, densément ponctué; pubescence du disque convergente vers la partie antérieure du diamètre longitudinal; carènes latérales très marquées vers la base, parallèles presque jusqu'au sommet. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, un peu plus de deux fois aussi longs que larges ensemble, densément ponctués, subsillonnés à la base. Pattes et antennes rougeâtres.

Hab. Brésil: Rio de Janeiro. — Collection Grouvelle.

TABLEAU DES DRYOPS DU BRÉSIL.

1. Longueur totale inférieure au triple de la largeur; forme très ovale . *ovatus* Grouv.
Longueur totale égale ou supérieure au triple de la largeur 2.
2. Ponctuation du disque du prothorax notablement plus faible que celle des élytres 3.
3. Ponctuation du disque du prothorax sensiblement aussi forte que celle des élytres 4.
3. Taille de 7 mill., ponctuation très forte, disposée en lignes peu régulières surtout sur le disque *cribratus* Grouv.

Notes from the Leyden Museum, Vol. XVIII.

- Taille de 3 $\frac{1}{2}$ à 4 mill.; ponctuation non disposée en lignes *hirtus* Group.
4. Ponctuation des élytres bien marquée, plutôt forte 5.
 Ponctuation des élytres fine 6.
5. Elytres un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble; pattes brunâtres *Gounellei* Group.
- Elytres plus de deux fois et demie aussi longs que larges ensemble; pattes testacées *crassus* Group.
6. Forme ovale, naviculaire, angles postérieurs du prothorax très aigus 7.
 Forme oblongue, angles postérieurs du prothorax presque droits 8.
7. Taille de 6 mill.; ponctuation des élytres très dense *vicinus* Group.
- Taille de 4 mill.; ponctuation des élytres un peu plus forte, pas très serrée *similis* Group.
8. Taille de 6 $\frac{1}{2}$ mill.; ponctuation des élytres très fine et très serrée *sublævis* Group.
- Taille de 4 mill.; ponctuation des élytres un peu plus forte, pas très serrée *sobrinus* Group.

Elsianus antiquus, n. sp.

Elongato-oblongus, convexus, niger, opacus, parce pubescens; fronte depressa, dense punctata; prothoracé transverso, antice posticeque angustato, sat dense leviterque granoso; elytris punctato-striatis, intervallis striis latioribus. — Long. 4 mill.

Allongé, oblong, convexe, noir, opaque, peu pubescent; crochets des tarses rougeâtres. Front déprimé, densément ponctué. Prothorax environ de moitié aussi long que large dans sa plus grande largeur, plus rétréci au

sommet qu'à la base, présentant le maximum de largeur vers le milieu de la longueur, peu densément, mais assez finement granuleux, régulièrement convexe, avec une très courte carène de chaque côté de la base. Ecusson orbiculaire, convexe. Elytres plus larges que le prothorax à la base, environ deux fois aussi longs que larges ensemble, ponctués-striés, avec un rudiment de strie supplémentaire entre la première et la deuxième stries dorsales; intervalles sur le disque plus larges que les stries, tous plans.

Hab. Brésil. — Collection Grouvelle.

Cyllopus consobrinus, n. sp.

Elongatus, subparallelus, subnitidus, parcissime pubescens, ater; duobus primis articulis antennarum et tarsis rufis; fronte depressa, subcoriacea; prothorace quadrato, antice prothoraceque angustato, lateribus anguloso, in longitudinem canaliculato, utrinque carinato, carinis basin versus magis elevatis, medio subinterruptis; scutello orbiculari, impresso; elytris punctato-striatis, punctis ad apicem minus impressis; intervallis 3° basin versus subelevato, 6° et 8° carinatis. — Long. 4 mill.

Allongé, subparallèle, assez brillant, très éparsément pubescent, noir; les deux premiers articles des antennes et les tarsi rougeâtres. Front déprimé, ruguleux, un peu élevé de chaque côté contre les yeux. Prothorax environ aussi long que large dans sa plus grande largeur, subhexagonal, sillonné longitudinalement sur la partie centrale du disque, caréné de chaque côté; carènes latérales très marquées dans la moitié basilaire, presque interrompues au milieu; marge entre la carène et le rebord concave, relevée extérieurement en un léger bourrelet granuleux. Ecusson orbiculaire, impressionné. Elytres plus larges que le prothorax à la base, environ deux fois aussi longs que larges ensemble, terminés chacun au sommet par un lobe arrondi peu marqué, ponctués-striés; stries, surtout les dorsales, atténuées vers le sommet; 3^{me} intervalle à

partir de la suture subélevé vers la base, 6^{me} et 8^{me} carénés.

Hab. Bolivie: Province de Cochabamba. — Collection Grouvelle.

Cette espèce semble, pour le moins, aussi variable que l'*H. Maugei* Latr.; sa taille, le rapport de sa longueur à sa largeur, l'importance de la fossette longitudinale de son prothorax, la profondeur des stries des élytres et des impressions qui accompagnent les carènes du prothorax etc. etc., varient dans des proportions notables. Un des exemplaires que nous avons sous les yeux a une fossette prothoracique presque nulle; chez un autre cette fossette devient une strie qui va de la base au sommet. Le tégument sur le prothorax et les interstries des élytres devient souvent assez fortement granuleux. Nous n'avons pas pu trouver de caractères assez tranchés pour caractériser au point de vue spécifique ces diverses formes.

Cyllepus Germaini, n. sp.

Elongatus, oblongus, convexus, sat nitidus, niger; antennis tarsisque rufis; prothorace transverso, subhexagonali, utrinque carinato, antice dense punctato, postice dense granoso, in medio margine basilari tuberculato; scutello orbiculari, tuberculato; elytris punctato-striatis, intervallis granosis. — Long. 5 à 6 mill.

Oblong, allongé, convexe, noir; antennes et tarse rougeâtres. Tête densément granuleuse, sillonnée entre les bases des antennes. Prothorax médiocrement transversal, subhexagonal, longitudinalement caréné de chaque côté, densément ponctué sur la partie antérieure du disque et densément tuberculeux dans la partie postérieure, avec un tubercule élevé au milieu de la marge basilaire. Ecusson orbiculaire, tuberculeux. Elytres plus larges à la base que le prothorax, un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble, acuminés vers le sommet, terminés chacun par un lobe assez bien marqué, ponctués-striés; intervalles, surtout vers la base, densément granuleux, très

faiblement élevés; un rudiment de strie, à la base, entre la première et la deuxième strie en partant de la suture.

Hab. Bolivie: Province de Cochabamba. — Collection Grouvelle.

Cyllæpus granosus, n. sp.

Elongatus, *oblongus*, *subconvexus*, *opacus*, *nigro-brunneus*, *dense granosus*; *prothorace transverso*, *medio in longitudinem sulcato*, *utrinque carinato*; *scutello orbiculari*; *elytris punctato-striatis*, *intervallis alternis modice elevatis*. — Long. 4 à 4½ mill.

Oblong, allongé, assez déprimé sur le disque, noir brunâtre; opaque, très finement et très densément granuleux. Front avec une impression arquée de chaque côté, limité en avant, au niveau des antennes, par une strie arquée. Prothorax transversal, plus rétréci au sommet qu'à la base, régulièrement arqué sur les côtés, longitudinalement sillonné strié sur le disque, caréné de chaque côté. Ecusson orbiculaire. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, moins de deux fois aussi longs que larges ensemble, subacuminés au sommet, ponctués-striés; intervalles alternes élevés surtout sur les côtés, un rudiment de strie entre les deux premières stries du côté de la suture. Antennes et tarses rougeâtres.

Hab. Brésil: Province de Rio de Janeiro. — Collection Grouvelle.

Stenelmis subsulcata, n. sp.

Elongata, *convexa*, *nigra*, *opaca*; *prothorace subquadrato*, *sat dense asperato*, *lateribus arcuatis*, *disco basin versus breviter bi-carinato*; *elytris dense flavo-griseo squamosis*, *punctato-striatis*, *intervallis punctis latioribus*. — Long. 3½ mill.

Allongé, convexe, noir, opaque; antennes et tarses rougeâtres. Prothorax sensiblement aussi long que large, arrondi sur les côtés, présentant sa plus grande largeur vers le tiers basilaire, chargé de fines aspérités assez serrées

et garni à la base devant l'écusson de deux rudiments de carènes longitudinales. Elytres en ovale très allongé, acuminés ensemble au sommet, un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble, couverts d'une squamosité jaune grisâtre masquant la couleur du tégument, ponctués-striés, stries 2 et 4 arrêtées avant le sommet; intervalles plus larges que les stries, présentant vers le sommet quelques points placés irrégulièrement.

Hab. Sumatra. — Un exemplaire, pris par le Dr. J. F. van Bemmelen pendant l'expédition IJzerman à travers de l'île, de Padang à Siak, dans la collection du Musée de Leyde; Deli, collection Grouvelle.

Stenelmis stricticollis, n. sp.

Elongata, convexa; antennis pedibusque testaceis; capite prothoraceque opacis, nigris; elytris subnitidis, piceis, basin versus et ad apicem testaceo-maculatis; fronte parce granosa, in longitudinem sulcata; prothorace granoso, antice angustato, lateribus subrectis, antice profunde sinuatis; elytris punctato-striatis, tertio intervalli et 7°—9° simul basin versus elevatis, testaceis. — Long. 3 mill.

Allongé, convexe, presque opaque sur le prothorax, un peu brillant sur les élytres, noir; antennes et pattes testacées, élytres bruns, tachés de testacé à la base sur les intervalles élevés et au sommet. Front très éparsement tuberculeux, tubercules brillants, très petits, se détachant sur un fond très opaque, limité anguleusement en avant et coupé dans la longueur par une impression sulciforme. Prothorax environ aussi long que large à la base, rétréci au sommet, coupé vers le tiers apicale par une impression transversale très obsolète sur le disque, très marquée vers les côtés qu'elle échancre fortement; disque chargé de petits tubercules brillants et serrés. Elytres plus larges que le prothorax, environ deux fois aussi longs que larges, ponctués-striés; 3^{me} intervalle à partir de la suture et 7^{me} à 9^{me} ensemble élevés à la base; 2^{me} et 4^{me} stries effacées

avant le sommet; taché apicale mal limitée, remontant sur la marge latérale.

Hab. Sumatra. — Collection Fry.

Stenelmis villosocostata, n. sp.

Elongatus, parallelus, convexus, nigricans; antennis pedibusque rufis; prothorace opaco, in longitudinem quadricarinato, carinis externis medio interruptis; elytris fortiter punctato-striatis, intervallis alternis dense ochraceo-villosis. — Long. 2 mill.

Allongé, parallèle, convexe, noirâtre; antennes et pattes rougeâtres. Tête et prothorax opaques; celui-ci presque rectangulaire, plus long que large, chargé dans la longueur de quatre reliefs costiformes, dont les deux externes sont interrompus dans le milieu; intervalles externes séparés en deux dépressions concaves par une légère élévation transversale. Ecusson orbiculaire, opaque. Elytres plus larges que le prothorax, environ deux fois aussi longs que larges ensemble, subacuminés ensemble au sommet, brillants, fortement ponctués-striés; intervalles plus étroits que les points, chargés de deux en deux par une villosité jaune épaisse qui leur donne l'apparence d'intervalles élevés.

Hab. Tonkin septentrional. — Collection Lamey.

Heterelmis neglecta, n. sp.

Ovata, convexa, nitida, nigra, parce pubescens; antennis, tibiis tarsisque rufis; prothorace punctato, antice angustato, lateribus arcuatis, utrinque carinato, carinis medio impressione brevi interruptis; scutello suborbiculari; elytris prothorace latioribus, ad apicem conjunctim subacuminatis, punctato-striatis, utrinque carinatis, carinis humeralibus, brevibus. — Long. 3 mill.

Ovale, convexe, noir, brillant, éparsement pubescent; antennes, tibias et tarse rougeâtres. Front légèrement convexe, densément ponctué, impressionné entre les nais-

sances des antennes; marge antérieure légèrement échan-crée, cachant presque complètement le labre. Prothorax moins long que large dans sa plus grande largeur, faiblement rétréci à la base, plus fortement au sommet, présentant sa plus grande largeur vers le quart basilaire, assez densément ponctué sur le disque, très fortement sur les côtés, caréné longitudinalement sur les côtés; carènes latérales interrompues au milieu par une courte impression oblique presque limitée aux marges latérales; bords latéraux relevés en un fin bourrelet granuleux. Écusson sub-orbiculaire. Elytres plus larges que le prothorax, à peine élargis jusque vers le milieu, puis acuminés vers le sommet, environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, ponctués-striés; intervalles très faiblement convexes et très légèrement ridés; intervalle huméral relevé en une courte carène granuleuse; 3^{me} intervalle à partir de la suture très légèrement relevé à la base.

Hab. Bolivie: Province de Cochabamba. — Collection Grouvelle.

Helmis Simsoni, n. sp.

Ovata, convexa, subopaca, tenue pubescens, ater; antennis tarsisque rufo piceis; prothorace antice posticeque angustato, lateribus rotundatis, antice explanatis, basin versus transversim impresso; scutello suborbiculari; elytris prothorace latioribus, punctato-striatis, intervallis depressis, striis latioribus. — Long. 3 mill.

Ovale, convexe, presque opaque, très éparsément et finement pubescent, noir; antennes et tarsi roux brun. Prothorax transversal, rétréci à la base et au sommet, présentant sa plus grande largeur vers le milieu de la longueur, arrondi sur les côtés, très légèrement hexagonal; marges latérales explanées en avant; disque plus finement et bien moins densément ponctué que les côtés; base légèrement relevée, déterminant une impression transversale. Écusson suborbiculaire. Elytres de la largeur du prothorax

à la base, s'élargissant jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur, environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble dans la plus grande largeur; assez finement ponctués-striés; intervalles très larges, déprimés.

Hab. Tasmanie. — Collection Fry.

Helmis thoracica, n. sp.

Elongata, vix convexa, nigra, nitida, parce pubescens; antennis rufo-testaceis, pedibus piceis; prothorace quadrato, antice angustato, utrinque carinato, transversim fortiter impresso; scutello ovato; elytris parallelis, ad apicem conjunctim acuminatis, lateribus carinatis, profunde grosseque punctato lineatis, punctis ad apicem evanescentibus. — Long. 2 mill.

Allongé, faiblement convexe, noir, brillant, très faiblement pubescent; antennes d'un roux testacé, pattes plus foncées. Prothorax sensiblement aussi long que large, rétréci au sommet, lisse, présentant de chaque côté une carène longitudinale et coupé, un peu en avant du milieu de sa longueur, par un large sillon allant d'un bord à l'autre mais ne faisant pas paraître le prothorax étranglé; espaces entre les carènes latérales et les côtés concaves, rétrécis dans la partie basilaire par le gonflement de la base de la carène. Ecusson ovale. Elytres en ovale allongé, acuminés ensemble au sommet, à peine deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, carénés longitudinalement de chaque côté, fortement ponctués en lignes; sommet lisse.

Hab. Bolivie: Province de Cochabamba. — Collection Grouvelle.

Cette espèce se place à côté des *H. nodipes* Sharp, *longipes* Grouv., *Simsoni* Grouv. et *cæsa* Lec. qui constituent un groupe caractérisé par le prothorax coupé transversalement par un sillon large et profond. Ces diverses espèces peuvent se caractériser de la manière suivante:

1. Disque du prothorax présentant plusieurs

- impressions profondes entre les carènes latérales *longipes* Grouv.
 Disque du prothorax sans impressions ou avec une légère impression entre les carènes latérales 2.
 2. Elytres ovales, moins de deux fois plus longs que larges *nodipes* Sharp.
 Elytres en ovale très allongé, au moins deux fois aussi longs que larges 3.
 3. Couleur ferrugineuse *cæsa* Lec.
 » noire 4.
 4. Prothorax rectangulaire, plus long que large; pattes roux ferrugineux . . *Simsoni* Grouv.
 Prothorax rétréci au sommet, pas plus long que large; pattes d'un brun de poix *thoracica* Grouv.

Helmis apicata, n. sp.

Ovata, modice convexa, nigra, nitida, vix pubescens; tibiis piceis, antennis pedibusque rufis; prothorace parce punctato, subhexagonali, utrinque carinato; scutello oblongo; elytris prothorace latioribus, ad apicem sublobatis, separatim rotundato-acuminatis, punctato-striatis, intervallis striis latioribus; ad apicem subrugosis. — Long. 3 mill.

Ovale, médiocrement convexe, noir, brillant, à peine pubescent; tibias roux de poix, antennes et tarses plus claires. Front légèrement convexe, relevé à la base des antennes, impressionné entre ces bases, échancré à la marge antérieure laissant à découvert le labre. Prothorax environ aussi long que large dans sa plus grande largeur, présentant celle-ci avant le milieu, subhexagonal, mais plus rétréci au sommet qu'à la base, longitudinalement caréné de chaque côté, étroitement déprimé le long de la base. Ecusson oblong, assez large. Elytres plus larges que le prothorax, arrondis sur les côtés, présentant leur plus grande largeur vers les deux tiers de la longueur, environ

une fois et demie aussi longs que larges dans la plus grande largeur, terminés au sommet par un lobe en demi ovale, subacuminé à l'extrémité, ponctués-striés; intervalles plans, beaucoup plus larges que les points, très finement ruguleux au sommet.

Hab. Equateur: Rio Humberto. — Collections Grouvelle et Pic.

Helmis tibialis, n. sp.

Ovata, modice convexa, nigra, nitida, parce pubescens; tibiis rufo-piceis, antennis tarsisque rufis; prothorace antice angustato, utrinque antice carinato et medio oblique profundeque impresso; scutello suborbiculari; elytris prothorace latioribus, punctato-striatis, intervallis punctis latioribus. — Long. 2 mill.

Ovale, peu convexe, noir, brillant, éparsément pubescent; tibias roux de poix, antennes et tarses rougeâtres. Prothorax environ aussi long que large à la base, subparallèle dans la moitié basilaire, rétréci ensuite vers le sommet, caréné longitudinalement de chaque côté; carène limitée vers le milieu par une impression oblique, large et assez profonde; marges latérales et basilaire déprimées, faisant ressortir la convexité du disque, les premières densément et fortement ponctuées, la dernière coupée en face de l'écusson par deux impressions punctiformes; partie convexe du disque vers les angles postérieurs coupée par un léger sillon oblique, dirigé de l'angle vers l'impression oblique latérale. Ecusson subcirculaire. Elytres plus larges que le prothorax, subparallèles sur les deux premiers tiers de la longueur, acuminés ensuite vers le sommet, environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, chacun avec une carène humérale bien marquée et six stries ponctuées entre cette carène et la suture; interstries plus larges que les points.

Hab. Bolivie: Province de Cochabamba. — Collection Grouvelle.

Helmis cervina, n. sp.

Ovata, convexa, nigra, nitida, pubescens; antennis tibiisque rufo-piceis; prothorace transverso, antice fortiter angustato, utrinque carinato, medio in longitudinem breviter sulcato, transversim leviter bi-impreso, ante scutellum bipunctato; scutello orbiculari; elytris prothorace latioribus, ad apicem conjunctim acuminatis, utrinque granoso-carinatis, punctato-striatis, intervallis striis valde latioribus. — Long. 2 mill.

Ovale, convexe, noir, brillant, assez pubescent; antennes, tibias et tarses rougeâtres. Front légèrement convexe, peu lisse, marge antérieure échancrée. Prothorax moins long que large dans sa plus grande largeur, à peine rétréci à la base, fortement au sommet, longitudinalement caréné de chaque côté, courtement sillonné sur le disque, coupé transversalement par deux faibles impressions et marqué de deux points enfoncés devant l'écusson; bords latéraux arqués, bordés d'un fin bourrelet granuleux. Ecusson subcirculaire. Elytres plus larges que le prothorax, à peine une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, subacuminés ensemble au sommet, subparallèles dans la partie basilaire, chacun avec deux carènes latérales granuleuses; stries ponctuées, peu accentuées sauf à la base; intervalles beaucoup plus larges que les points.

Hab. Bolivie: Province de Cochabamba. — Collection Grouvelle.

Helmis longior, n. sp.

Ovata, modice convexa, nigra, nitida, parce pubescens, femoribus piceis, antennis tibiisque rufo-piceis; prothorace subtransverso, antice angustato, utrinque carinato, lateribus carinisque medio sinuatis, disco transversim impreso; scutello suborbiculari; elytris ovatis, prothorace latioribus, ad apicem conjunctim subacuminatis, punctato-striatis, intervallis striis latioribus. — Long. 4 mill.

Ovale, médiocrement convexe, noir, brillant, très faiblement pubescent; fémurs couleur de poix, antennes, tibiae et tarses plus claires. Front strié entre les antennes, relevé à leurs bases; antennes insérées à l'angle interne des yeux. Prothorax éparsément ponctué, à peine aussi long que large dans sa plus grande largeur, plus rétréci au sommet qu'à la base, présentant sa plus grande largeur vers le quart basilaire, caréné longitudinalement de chaque côté; bords latéraux et carènes latérales sinués au milieu; disque coupé transversalement par une impression peu profonde. Ecusson semi-circulaire. Elytres plus larges que le prothorax, présentant leur plus grande largeur vers le dernier tiers, subacuminés ensemble au sommet, ponctués-striés, sans carènes latérales bien marquées, sauf à la base; intervalles des stries plus larges que les stries.

Hab. Bolivie: Province de Cochabamba. — Collection Grouvelle.

Paris, Avril 1896.