

Korte mededelingen

Trifolium ornithopodioides L. op Ameland. Op dezelfde dijk waar hij *Trifolium micranthum* Viv. ontdekte, nl. bij de Reeweg, ten zuiden van Hollum, vond de heer D. T. E. van der Ploeg in augustus 1964 de zeldzame *T. ornithopodioides* L. Van de Waddeneilanden was deze soort alleen nog maar bekend van Vlieland (1903) en Terschelling (zonder datum, doch vermoedelijk gevonden in een van de eerste decennia van deze eeuw).
v. O. en R.

Sherardia arvensis L. Op 25 juni 1964 werd door H. N. Leys en J. F. Bannink in een haver-gerst-perceel bij Schadijk, gem. Horst, L., op een oud stuk bouwland met een dun cultuurdek waarin enige stuifzandinvloed, *Sherardia arvensis* gevonden, een soort die door ons in dit gebied nimmer eerder werd aangetroffen, hoewel wij deze streek veel hebben bezocht en intensief geïnventariseerd.

Gewas: haver-gerst (mengteelt)

Bedekking gewas 55 %; hoogte gewas 100 cm

Bedekking onkruid 20 %; hoogte onkruid 50 cm

<i>Apera spica-venti</i>	p	<i>Viola arvensis</i>	6 %
<i>Vicia angustifolia</i>	p	<i>Polygonum convolvulus</i>	10 %
<i>Raphanus raphanistrum</i>	1 ex.	<i>Solanum nigrum</i>	r
<i>Veronica arvensis</i>	a	<i>Stellaria media</i>	r
<i>Myosotis arvensis</i>	r	<i>Polygonum aviculare</i>	r
<i>Sherardia arvensis</i>	1 ex.	<i>Agrostis stolonifera</i>	2 %
<i>Erodium cicutarium</i>	r	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	p
<i>Spergula arvensis</i>	p	<i>Poa annua</i>	r
<i>Centaurea cyanus</i>	r	<i>Urtica urens</i>	r
<i>Chenopodium album</i>	a		

Ede

H. N. Leys