

SCIRPUS LACUSTRIS L. SSP. FLEVENSIS BAKKER

(ontv. 14 Dec. 1956)

De ssp. flevensis was tot voor kort alleen bekend van de IJselmeerkust ter hoogte van het Kampereiland en van Schokkerhaven in de Noordoostpolder. In de zomer van 1956 ontdekte ik de plant tevens op een eilandje in het Kadoelermeer bij Vollenhove en aan de rand van een matig voedselrijk veen tussen Rotsterhaule en Rotstergaast in Friesland. Bovendien trof ik een ex. aan in het "Herbarium Frisicum" van D.T.E. v.d. Ploeg (nr. 49-179), op 16 Aug. 1949 in een oevervegetatie bij Akkerwoude in Friesland verzameld; deze plant was door Kloos als *Scirpus tabernaemontani* Gmel. gedetermineerd.

*S. lacustris* ssp. *flevensis* lijkt in habitus vrij sterk op ssp. *glaucus* (Sm.) Hartm. (*S. tabernaemontani* Gmel. der flora's), doch in kenmerken is zij intermediair tussen ssp. *lacustris* (*S. lacustris* L. der flora's) en ssp. *glaucus*. Voor de kenmerken kan naar p.430 van vol.3 van de *Acta Botanica Neerlandica* (1954) worden verwezen.

Het lijkt mij niet onmogelijk, dat de ssp. flevensis ook op andere plaatsen voorkomt. Teneinde een inzicht te verkrijgen in de verspreiding en oecologie van deze ondersoort, verzoek ik alle belangstellenden op deze bies te letten en bij aantreffen materiaal aan mij toe te zenden, bij voorkeur voorzien van een beschrijving van de groeiplaats.

Ens (N.O.P.), Baan 6.

D. Bakker.